

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** C3 (Líquido Pleural)**Código Unificado Andaluz:** BA00014**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica:** Disponible de lunes a viernes**Tiempo de respuesta:** 8 horas**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** L.pleural**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 200 µl**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** mg/dL**Valores de referencia:****DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** CEA L.C.R.**Código Unificado Andaluz:** BA00015**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específicos** Disponible de lunes a viernes**Tiempo de respuesta** 8 horas**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba** NO**Dieta previa a la prueba** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba** NO**Otras consideraciones** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen** LCR**Tipo de contenedor** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo** 200 µl**Conservante** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra****Observaciones a la toma del espécimen****Recomendaciones para transporte** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones****DEL RESULTADO****Unidades internacionales****Unidades convencionales****Factores de conversión** ng/mL**Valores de referencia****DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** CEA L.Biológicos**Código Unificado Andaluz:** BA00016**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica** Disponible de lunes a viernes**Tiempo de respuesta** 8 horas**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba** NO**Dieta previa a la prueba** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba** NO**Otras consideraciones** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen** L.biologico**Tipo de contenedor** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo** 200 ul**Conservante** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra****Observaciones a la toma del espécimen****Recomendaciones para transporte** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones****DEL RESULTADO****Unidades internacionales****Unidades convencionales****Factores de conversión** ng/mL**Valores de referencia****DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Inmunoglobulina G**Código Unificado Andaluz:** BA00650**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica:** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Tiempo de respuesta:** 1 hora**Volante de petición:** Adultos (suero) 7 – 16 g/L (700 – 1600 mg/dL) CSF 15 – 20 años 35 mg/L**¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** L.biológico**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 1ml**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** mg/dL**Valores de referencia:** La IgG favorece la fagocitosis y activa el complemento.**DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:

Sinónimos: Calcio (líq. drenaje)

Código Unificado Andaluz: BA20270

Disponible para: Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específico: Disponible de lunes a viernes

Tiempo de respuesta: 8 horas

Volante de petición:

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos? NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba: NO

Dieta previa a la prueba: NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba: NO

Otras consideraciones: NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen: L.drenaje

Tipo de contenedor: Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo: 200 ul

Conservante: NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:

Observaciones a la toma del espécimen:

Recomendaciones para transporte: En mano (no en tubo neumático)

Otras consideraciones:

DEL RESULTADO

Unidades internacionales:

Unidades convencionales:

Factores de conversión: mg/dL

Valores de referencia:

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica:

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:

Sinónimos: Albúmina (líq. drenaje)

Código Unificado Andaluz: BA20271

Disponible para: Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específicos: Disponible 24 horas de lunes a domingo

Tiempo de respuesta: 1 hora

Volante de petición:

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos? NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba: NO

Dieta previa a la prueba: NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba: NO

Otras consideraciones: NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen: L.drenaje

Tipo de contenedor: Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo: 200 µl

Conservante: NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:

Observaciones a la toma del espécimen:

Recomendaciones para transporte: En mano (no en tubo neumático)

Otras consideraciones:

DEL RESULTADO

Unidades internacionales:

Unidades convencionales:

Factores de conversión: g/dL

Valores de referencia: Sus funciones biológicas primarias consisten en transportar y almacenar un

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica:

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:

Sinónimos: Acido úrico (líq. sinovial)

Código Unificado Andaluz: CLC00422

Disponible para: Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específica: Disponible 24 horas de lunes a domingo

Tiempo de respuesta: 1 hora

Volante de petición

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos? NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba: NO

Dieta previa a la prueba: NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba: NO

Otras consideraciones: NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen: Líquido ascítico

Tipo de contenedor: Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo: 200 µl

Conservante: NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:

Observaciones a la toma del espécimen:

Recomendaciones para transporte: En mano (no en tubo neumático)

Otras consideraciones:

DEL RESULTADO

Unidades internacionales: mg/dl

Unidades convencionales:

Factores de conversión: mg/dL

Valores de referencia: El ácido úrico es el principal producto del catabolismo de la purina en humanos

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica:

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Adenosina desaminasa (líq. sinovial)**Código Unificado Andaluz:** CLC00423**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica:** Disponible de lunes a viernes**Tiempo de respuesta:** 8 horas**Volante de petición:** 0 a 15 U/L**¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** LIQUIDO SINOVIAL**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 200 ul**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** U/L**Valores de referencia:** Es una enzima catalizadora de la reacción desaminasa de la adenosina en i**DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Factor reumatoide (líq. pericárdico)**Código Unificado Andaluz:** CLC00424**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica:** Disponible de lunes a viernes**Tiempo de respuesta:** 8 horas**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** L.pericardico**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 200 ul**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** UI/mL**Valores de referencia:****DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Inmunoglobulina A (LCR)**Código Unificado Andaluz:** CLC00425**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica:** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Tiempo de respuesta:** 1 hora**Volante de petición:** <0,50**¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** LCR**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 1 ml**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** Refrigerado**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** mg/dL**Valores de referencia:****DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Inmunoglobulina M (LCR)**Código Unificado Andaluz:** CLC00426**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica:** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Tiempo de respuesta:** 1 hora**Volante de petición:** Adultos 0,4 – 2,3 g/L (40 – 230 mg/dL) Niños 0,2 – 2,0 g/L (20 – 200 mg/dL)**¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** LCR**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 1ml**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** mg/dL**Valores de referencia:** Las funciones esenciales de la IgM en la respuesta inmunitaria son la aglutinación y la fijación de complemento.**DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Proteína Tau-P (LCR)**Código Unificado Andaluz:** CLC06318**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica:** Disponible de lunes a viernes**Tiempo de respuesta:** 8 horas**Volante de petición:** >27 es positivo y <27 es negativo.**¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** CONSULTA ALZHEIMER**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** LCR**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 200 µl**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** pg/mL**Valores de referencia:** No establece un resultado positivo el diagnóstico de la enfermedad hay que**DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Glucosa (líq. drenaje)**Código Unificado Andaluz:** CLC07078**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica:** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Tiempo de respuesta:** 1 hora**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** L.drenaje**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 200 µl**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** mg/dL**Valores de referencia:** Las fluctuaciones observadas en las concentraciones glucémicas de individuo**DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Proteínas totales (líq. bdrenaje)**Código Unificado Andaluz:** CLC07079**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específicos:** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Tiempo de respuesta:** 8 horas**Volante de petición:****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** L.drenaje**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 200 µl**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** g/dL**Valores de referencia:** Las cuantificaciones de la proteína total permiten diagnosticar y tratar diversas enfermedades.**DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:

Sinónimos: "Mononucleares (porcentaje; líq. pleural)"

Código Unificado Andaluz: CLC20170

Disponible para: Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específicos: Disponible 24 horas de lunes a domingo

Tiempo de respuesta: 1 hora

Volante de petición:

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos? NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba: NO

Dieta previa a la prueba: NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba: NO

Otras consideraciones: NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen: L.pleural

Tipo de contenedor: Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo: 200 µl

Conservante: NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:

Observaciones a la toma del espécimen:

Recomendaciones para transporte: En mano (no en tubo neumático)

Otras consideraciones:

DEL RESULTADO

Unidades internacionales:

Unidades convencionales:

Factores de conversión: %

Valores de referencia:

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica:

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Glucosa (líq. sinovial)**Código Unificado Andaluz:** CLC20178**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica:** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Tiempo de respuesta:** 1 hora**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** L.sinovial**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 200 ul**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** mg/dL**Valores de referencia:** Las fluctuaciones observadas en las concentraciones glucémicas de individuo**DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:

Sinónimos: Proteínas totales (líq. sinovial)

Código Unificado Andaluz: CLC20179

Disponible para: Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específica: Disponible 24 horas de lunes a domingo

Tiempo de respuesta: 8 horas

Volante de petición

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos? NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba: NO

Dieta previa a la prueba: NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba: NO

Otras consideraciones: NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen: L.sinovial

Tipo de contenedor: Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo: 200 ul

Conservante: NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:

Observaciones a la toma del espécimen:

Recomendaciones para transporte: En mano (no en tubo neumático)

Otras consideraciones:

DEL RESULTADO

Unidades internacionales:

Unidades convencionales:

Factores de conversión: g/dL

Valores de referencia:

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica:

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** beta-2-Microglobulina (líq. sinovial)**Código Unificado Andaluz:** CLC20182**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica:** Disponible de lunes a viernes**Tiempo de respuesta:** 8 horas**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** L. ascítico**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 200 µl**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** mg/L**Valores de referencia:****DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Urea (líq. drenaje)**Código Unificado Andaluz:** CLC20183**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Tiempo de respuesta** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** SI**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba** NO**Dieta previa a la prueba** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba** NO**Otras consideraciones** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen** orina**Tipo de contenedor** Tubo de tapón amarillo,**Volumen mínimo** 2 ml**Conservante** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra****Observaciones a la toma del espécimen****Recomendaciones para transporte** Refrigerado**Otras consideraciones****DEL RESULTADO****Unidades internacionales****Unidades convencionales****Factores de conversión** mg/dL**Valores de referencia****DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Lactato deshidrogenasa (líq. sinovial)**Código Unificado Andaluz:** CLC20184**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica:** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Tiempo de respuesta:** 1 hora**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** L.sinovial**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 1ml**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** U/L**Valores de referencia:****DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Factor reumatoide (líq. sinovial)**Código Unificado Andaluz:** CLC20185**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica:** Disponible de lunes a viernes**Tiempo de respuesta:** 8 horas**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** L.sinovial**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 200 µl**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** UI/mL**Valores de referencia:****DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Creatinina (líq. drenaje)**Código Unificado Andaluz:** CLC20186**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específicos:** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Tiempo de respuesta:** 8 horas**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** L.drenaje**Tipo de contenedor:** Tubo de tapón amarillo**Volumen mínimo:** 200 ul**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** mg/dL**Valores de referencia:** La creatinina es un producto metabólico de la creatina y la fosfocreatina, c**DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:

Sinónimos: "Hematies (recuento; líq. sinovial)"

Código Unificado Andaluz: CLC20190

Disponible para: Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específica: Disponible 24 horas de lunes a domingo

Tiempo de respuesta: 1 hora

Volante de petición

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos? NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba: NO

Dieta previa a la prueba: NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba: NO

Otras consideraciones: NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen: L.sinovial

Tipo de contenedor: Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo: 200 ul

Conservante: NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:

Observaciones a la toma del espécimen:

Recomendaciones para transporte: En mano (no en tubo neumático)

Otras consideraciones:

DEL RESULTADO

Unidades internacionales:

Unidades convencionales:

Factores de conversión: hem/ μ L

Valores de referencia:

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica:

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:

Sinónimos: "Leucocitos (recuento; líq. sinovial)"

Código Unificado Andaluz: CLC20191

Disponible para: Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específica: Disponible 24 horas de lunes a domingo

Tiempo de respuesta: 1 hora

Volante de petición

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos? NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba: NO

Dieta previa a la prueba: NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba: NO

Otras consideraciones: NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen: L.sinovial

Tipo de contenedor: Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo: 200 ul

Conservante: NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:

Observaciones a la toma del espécimen:

Recomendaciones para transporte: En mano (no en tubo neumático)

Otras consideraciones:

DEL RESULTADO

Unidades internacionales:

Unidades convencionales:

Factores de conversión: leu/ μ L

Valores de referencia:

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica:

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:

Sinónimos: "Polimorfonucleares (porcentaje; líq. sinovial)"

Código Unificado Andaluz: CLC20192

Disponible para: Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específica: Disponible 24 horas de lunes a domingo

Tiempo de respuesta: 1 hora

Volante de petición

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos? NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba: NO

Dieta previa a la prueba: NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba: NO

Otras consideraciones: NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen: L.sinovial

Tipo de contenedor: Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo: 200 ul

Conservante: NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:

Observaciones a la toma del espécimen:

Recomendaciones para transporte: En mano (no en tubo neumático)

Otras consideraciones:

DEL RESULTADO

Unidades internacionales:

Unidades convencionales:

Factores de conversión: %

Valores de referencia:

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica:

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:

Sinónimos: "Mononucleares (porcentaje; líq. sinovial)"

Código Unificado Andaluz: CLC20193

Disponible para: Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específica: Disponible 24 horas de lunes a domingo

Tiempo de respuesta: 1 hora

Volante de petición

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos? NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba: NO

Dieta previa a la prueba: NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba: NO

Otras consideraciones: NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen: L.sinovial

Tipo de contenedor: Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo: 200 ul

Conservante: NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:

Observaciones a la toma del espécimen:

Recomendaciones para transporte: En mano (no en tubo neumático)

Otras consideraciones:

DEL RESULTADO

Unidades internacionales:

Unidades convencionales:

Factores de conversión: %

Valores de referencia:

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica:

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:

Sinónimos: "Otras células (porcentaje; líq. ascítico)"

Código Unificado Andaluz: CLC20195

Disponible para: Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específicos: Disponible 24 horas de lunes a domingo

Tiempo de respuesta: 1 hora

Volante de petición

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos? NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba: NO

Dieta previa a la prueba: NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba: NO

Otras consideraciones: NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen: L.sinovial

Tipo de contenedor: Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo: 200 ul

Conservante: NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:

Observaciones a la toma del espécimen:

Recomendaciones para transporte: En mano (no en tubo neumático)

Otras consideraciones:

DEL RESULTADO

Unidades internacionales:

Unidades convencionales:

Factores de conversión: %

Valores de referencia:

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica:

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Bilirrubina total (líq. drenaje)**Código Unificado Andaluz:** CLC20201**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica:** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Tiempo de respuesta:** 8 horas**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** L.drenaje**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 200 µl**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** mg/dL**Valores de referencia:****DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:

Sinónimos: alfa-Amilasa (líq. drenaje)

Código Unificado Andaluz: CLC20204

Disponible para: Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específica: Disponible 24 horas de lunes a domingo

Tiempo de respuesta: 1 hora

Volante de petición

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos? NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba: NO

Dieta previa a la prueba: NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba: NO

Otras consideraciones: NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen: L.drenaje

Tipo de contenedor: Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo: 200 ul

Conservante: NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:

Observaciones a la toma del espécimen:

Recomendaciones para transporte: En mano (no en tubo neumático)

Otras consideraciones:

DEL RESULTADO

Unidades internacionales:

Unidades convencionales:

Factores de conversión: U/L

Valores de referencia: Las amilasas son un grupo de hidrolasas que degradan los carbohidratos c

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica:

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Sodio (líq. drenaje)**Código Unificado Andaluz:** CLC20205**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específicos** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Tiempo de respuesta** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** SI**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba** NO**Dieta previa a la prueba** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba** NO**Otras consideraciones** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen** orina**Tipo de contenedor** Tubo de tapón amarillo,**Volumen mínimo** 2 ml**Conservante** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra****Observaciones a la toma del espécimen****Recomendaciones para transporte** Refrigerado**Otras consideraciones****DEL RESULTADO****Unidades internacionales****Unidades convencionales****Factores de conversión** mEq/L**Valores de referencia****DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Potasio (líq. drenaje)**Código Unificado Andaluz:** CLC20206**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica:** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Tiempo de respuesta:** 1 hora**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** L.drenaje**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 200 ul**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra****Observaciones a la toma del espécimen****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones****DEL RESULTADO****Unidades internacionales****Unidades convencionales****Factores de conversión:** mEq/L**Valores de referencia****DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Bilirrubina total (líq. biológico)**Código Unificado Andaluz:** CLC20212**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica:** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Tiempo de respuesta:** 8 horas**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** L.biologico**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 200 ul**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** mg/dL**Valores de referencia:****DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Lactato deshidrogenasa (líq. biológico) (LDH)**Código Unificado Andaluz:** CLC20213**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica:** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Tiempo de respuesta:** 1 hora**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** L.biologico**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 1ml**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** U/L**Valores de referencia:****DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** pH (líq. diálisis peritoneal)**Código Unificado Andaluz:** CLC20224**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específicas:** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Tiempo de respuesta:** 1 hora**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** L.dialisis peritoneal**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 200 ul**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra****Observaciones a la toma del espécimen****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones****DEL RESULTADO****Unidades internacionales****Unidades convencionales****Factores de conversión****Valores de referencia****DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:

Sinónimos: Albúmina (líq. diálisis peritoneal)

Código Unificado Andaluz: CLC20249

Disponible para: Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específica: Disponible 24 horas de lunes a domingo

Tiempo de respuesta: 1 hora

Volante de petición

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos? NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba: NO

Dieta previa a la prueba: NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba: NO

Otras consideraciones: NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen: DIALISIS peritoneal

Tipo de contenedor: Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo: 200 µl

Conservante: NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:

Observaciones a la toma del espécimen:

Recomendaciones para transporte: En mano (no en tubo neumático)

Otras consideraciones:

DEL RESULTADO

Unidades internacionales:

Unidades convencionales:

Factores de conversión: g/dL

Valores de referencia: Sus funciones biológicas primarias consisten en transportar y almacenar un

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica:

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Proteínas totales (líq. diálisis peritoneal)**Código Unificado Andaluz:** CLC20268**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica:** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Tiempo de respuesta:** 8 horas**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** L.peritoneal**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 200 ul**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra****Observaciones a la toma del espécimen****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones****DEL RESULTADO****Unidades internacionales****Unidades convencionales****Factores de conversión:** g/dL**Valores de referencia****DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** pH (vCord)**Código Unificado Andaluz:** CLC00751**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específicos:** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Tiempo de respuesta:** 1 hora**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** cordón**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 200 µl**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:****Valores de referencia:****DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Alfa-Fetoproteína (líq. biológico)**Código Unificado Andaluz:** CLC02694**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica** Disponible de lunes a viernes**Tiempo de respuesta** 2 horas**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba** NO**Dieta previa a la prueba** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba** NO**Otras consideraciones** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen** L.biologico**Tipo de contenedor** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo** 200 ul**Conservante** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra****Observaciones a la toma del espécimen****Recomendaciones para transporte** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones****DEL RESULTADO****Unidades internacionales****Unidades convencionales****Factores de conversión** ng/mL**Valores de referencia** Alfa-fetoproteína (AFP) es una glucoproteína de cadena única, con una ma**DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** CA 125 (líq. biológico)**Código Unificado Andaluz:** CLC02696**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica** Disponible de lunes a viernes**Tiempo de respuesta** 8 horas**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba** NO**Dieta previa a la prueba** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba** NO**Otras consideraciones** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen** L.biologico**Tipo de contenedor** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo** 200 ul**Conservante** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra****Observaciones a la toma del espécimen****Recomendaciones para transporte** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones****DEL RESULTADO****Unidades internacionales****Unidades convencionales****Factores de conversión** U/mL**Valores de referencia****DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** CA 15.3 (líq. biológico)**Código Unificado Andaluz:** CLC02697**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica:** Disponible de lunes a viernes**Tiempo de respuesta:** 8 horas**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** L.biologico**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 200 ul**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** U/mL**Valores de referencia:****DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** CA 19.9 (líq. biológico)**Código Unificado Andaluz:** CLC02698**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica** Disponible de lunes a viernes**Tiempo de respuesta** 8 horas**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba** NO**Dieta previa a la prueba** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba** NO**Otras consideraciones** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen** L.biologico**Tipo de contenedor** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo** 200 ul**Conservante** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra****Observaciones a la toma del espécimen****Recomendaciones para transporte** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones****DEL RESULTADO****Unidades internacionales****Unidades convencionales****Factores de conversión** U/mL**Valores de referencia****DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Alfa-Fetoproteína (líq. pleural)**Código Unificado Andaluz:** CLC02703**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica** Disponible de lunes a viernes**Tiempo de respuesta** 2 horas**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba** NO**Dieta previa a la prueba** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba** NO**Otras consideraciones** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen** L.pleural**Tipo de contenedor** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo** 200 ul**Conservante** no**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra****Observaciones a la toma del espécimen****Recomendaciones para transporte** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones****DEL RESULTADO****Unidades internacionales****Unidades convencionales****Factores de conversión** ng/mL**Valores de referencia** Alfa-fetoproteína (AFP) es una glucoproteína de cadena única, con una ma**DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** CA 125 (líq. pleural)**Código Unificado Andaluz:** CLC02704**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica:** Disponible de lunes a viernes**Tiempo de respuesta:** 8 horas**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** L.pleural**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 200 µl**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** U/mL**Valores de referencia:****DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** CA 15.3 (líq. pleural)**Código Unificado Andaluz:** CLC02705**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específicos:** Disponible de lunes a viernes**Tiempo de respuesta:** 8 horas**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** L.pleural**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 200 µl**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** U/mL**Valores de referencia:****DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Factor reumatoide (líq. pleural)**Código Unificado Andaluz:** CLC02818**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica:** Disponible de lunes a viernes**Tiempo de respuesta:** 8 horas**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** L.pleural**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 200 µl**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** UI/mL**Valores de referencia:****DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Urea (líq. biológico)**Código Unificado Andaluz:** CLC03013**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específicos:** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Tiempo de respuesta:** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** SI**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** orina**Tipo de contenedor:** Tubo de tapón amarillo,**Volumen mínimo:** 2 ml**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** Refrigerado**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** mg/dL**Valores de referencia:****DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Creatinina (líq. biológico)**Código Unificado Andaluz:** CLC03014**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específicos:** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Tiempo de respuesta:** 8 horas**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** L.biologico**Tipo de contenedor:** Tubo de tapón amarillo**Volumen mínimo:** 200 ul**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** mg/dL**Valores de referencia:** La creatinina es un producto metabólico de la creatina y la fosfocreatina, c**DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Enzima convertidora de Angiotensina (LCR)**Código Unificado Andaluz:** CLC03285**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica:** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Tiempo de respuesta:** 8 horas**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** LCR**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 200 µl**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** U/L**Valores de referencia:****DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Adenosina desaminasa (líq. ascítico)**Código Unificado Andaluz:** CLC20006**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica:** Disponible de lunes a viernes**Tiempo de respuesta:** 8 horas**Volante de petición:** 0 a 15 U/L**¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** LIQUIDO ASCITICO**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 200 ul**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** U/L**Valores de referencia:** Es una enzima catalizadora de la reacción desaminasa de la adenosina en i**DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Adenosina desaminasa (líq. pericárdico)**Código Unificado Andaluz:** CLC20007**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica:** Disponible de lunes a viernes**Tiempo de respuesta:** 8 horas**Volante de petición:** 0 a 15 U/L**¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** LIQUIDO PERICARDICO**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 200 ul**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** U/L**Valores de referencia:** Es una enzima catalizadora de la reacción desaminasa de la adenosina en i**DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Glucosa (líq. biológico)**Código Unificado Andaluz:** CLC20013**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica:** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Tiempo de respuesta:** 1 hora**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** L.biologico**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 200 ul**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** mg/dL**Valores de referencia:** Las fluctuaciones observadas en las concentraciones glucémicas de individuo**DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Adenosina desaminasa (líq. biológico)**Código Unificado Andaluz:** CLC20022**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica:** Disponible de lunes a viernes**Tiempo de respuesta:** 8 horas**Volante de petición:** 0 a 15 U/L**¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** LIQUIDO BIOLOGICO**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 200 ul**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** U/L**Valores de referencia:** Es una enzima catalizadora de la reacción desaminasa de la adenosina en i**DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Glucosa (líq. diálisis peritoneal)**Código Unificado Andaluz:** CLC20032**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica:** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Tiempo de respuesta:** 1 hora**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** L.peritoneal**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 200 ul**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** mg/dL**Valores de referencia:** Las fluctuaciones observadas en las concentraciones glucémicas de individuo**DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Urea (líq. diálisis peritoneal)**Código Unificado Andaluz:** CLC20035**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica:** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Tiempo de respuesta:** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** SI**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** orina**Tipo de contenedor:** Tubo de tapón amarillo,**Volumen mínimo:** 2 ml**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** Refrigerado**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** mg/dL**Valores de referencia:****DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Creatinina (líq. diálisis peritoneal)**Código Unificado Andaluz:** CLC20036**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica:** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Tiempo de respuesta:** 8 horas**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** L.peritoneal**Tipo de contenedor:** Tubo de tapón amarillo**Volumen mínimo:** 200 ul**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** mg/dL**Valores de referencia:** La creatinina es un producto metabólico de la creatina y la fosfocreatina, c**DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Sodio (líq. diálisis peritoneal)**Código Unificado Andaluz:** CLC20037**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específicas:** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Tiempo de respuesta:** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Volante de petición:****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** SI**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** orina**Tipo de contenedor:** Tubo de tapón amarillo,**Volumen mínimo:** 2 ml**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** Refrigerado**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** mEq/L**Valores de referencia:****DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Potasio (líq. diálisis peritoneal)**Código Unificado Andaluz:** CLC20038**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica:** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Tiempo de respuesta:** 1 hora**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** L.peritoneal**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 200 µl**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** mEq/L**Valores de referencia:****DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Cloro (líq. diálisis peritoneal)**Código Unificado Andaluz:** CLC20039**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica:** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Tiempo de respuesta:** 8 horas**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** L.peritoneal**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 200 ul**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** mEq/L**Valores de referencia:** Sirven para mantener la presión osmótica, la hidratación de los diversos co**DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Glucosa (líq. amniótico)**Código Unificado Andaluz:** CLC20040**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica:** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Tiempo de respuesta:** 1 hora**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** L.amniotico**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 200 ul**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** mg/dL**Valores de referencia:** Las fluctuaciones observadas en las concentraciones glucémicas de individuo**DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:

Sinónimos: "Hematíes (recuento; líq. diálisis peritoneal)"

Código Unificado Andaluz: CLC20047

Disponible para: Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específica: Disponible 24 horas de lunes a domingo

Tiempo de respuesta: 1 hora

Volante de petición:

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos? NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba: NO

Dieta previa a la prueba: NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba: NO

Otras consideraciones: NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen: L.peritoneal

Tipo de contenedor: Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo: 200 μ L

Conservante: NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:

Observaciones a la toma del espécimen:

Recomendaciones para transporte: En mano (no en tubo neumático)

Otras consideraciones:

DEL RESULTADO

Unidades internacionales:

Unidades convencionales:

Factores de conversión: hem/ μ L

Valores de referencia:

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica:

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Glucosa (líq. ascítico)**Código Unificado Andaluz:** CLC20059**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica:** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Tiempo de respuesta:** 1 hora**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** L.ascitico**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 200 ul**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** mg/dL**Valores de referencia:** Las fluctuaciones observadas en las concentraciones glucémicas de individuo**DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Proteínas totales (líq. ascítico)**Código Unificado Andaluz:** CLC20060**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específicos:** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Tiempo de respuesta:** 8 horas**Volante de petición:****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** L.ascitico**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 200 ul**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** g/dL**Valores de referencia:****DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:

Sinónimos: Albúmina (líq. ascítico)

Código Unificado Andaluz: CLC20061

Disponible para: Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específicos: Disponible 24 horas de lunes a domingo

Tiempo de respuesta: 1 hora

Volante de petición

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos? NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba: NO

Dieta previa a la prueba: NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba: NO

Otras consideraciones: NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen: L.ASCITICO

Tipo de contenedor: Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo: 200 ul

Conservante: NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:

Observaciones a la toma del espécimen:

Recomendaciones para transporte: En mano (no en tubo neumático)

Otras consideraciones:

DEL RESULTADO

Unidades internacionales:

Unidades convencionales:

Factores de conversión: g/dL

Valores de referencia: Sus funciones biológicas primarias consisten en transportar y almacenar un

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica:

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Lactato deshidrogenasa (líq. ascítico)**Código Unificado Andaluz:** CLC20062**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica:** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Tiempo de respuesta:** 1 hora**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** L.ascítico**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 1ml**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** U/L**Valores de referencia:****DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:

Sinónimos: alfa-Amilasa (líq. ascítico)

Código Unificado Andaluz: CLC20063

Disponible para: Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específicos: Disponible 24 horas de lunes a domingo

Tiempo de respuesta: 1 hora

Volante de petición

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos? NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba: NO

Dieta previa a la prueba: NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba: NO

Otras consideraciones: NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen: L.ascítico

Tipo de contenedor: Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo: 200 ul

Conservante: NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:

Observaciones a la toma del espécimen:

Recomendaciones para transporte: En mano (no en tubo neumático)

Otras consideraciones:

DEL RESULTADO

Unidades internacionales:

Unidades convencionales:

Factores de conversión: U/L

Valores de referencia: Las amilasas son un grupo de hidrolasas que degradan los carbohidratos c

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica:

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Trigliceridos (líq. ascítico)**Código Unificado Andaluz:** CLC20064**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica:** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Tiempo de respuesta:** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** SI**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** orina**Tipo de contenedor:** Tubo de tapón amarillo,**Volumen mínimo:** 2 ml**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** Refrigerado**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** mg/dL**Valores de referencia:****DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Alfa-Fetoproteína (líq. ascítico)**Código Unificado Andaluz:** CLC20066**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica:** Disponible de lunes a viernes**Tiempo de respuesta:** 2 horas**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** L.ascítico**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 200 µl**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** ng/mL**Valores de referencia:** Alfa-fetoproteína (AFP) es una glucoproteína de cadena única, con una ma**DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:

Sinónimos: Antígeno carcinoembrionario (líq. ascítico)

Código Unificado Andaluz: CLC20067

Disponible para: Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específica: Disponible de lunes a viernes

Tiempo de respuesta: 2 horas

Volante de petición

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos? NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba: NO

Dieta previa a la prueba: NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba: NO

Otras consideraciones: NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen: L.ascítico

Tipo de contenedor: Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo: 200 ul

Conservante: NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:

Observaciones a la toma del espécimen:

Recomendaciones para transporte: En mano (no en tubo neumático)

Otras consideraciones:

DEL RESULTADO

Unidades internacionales:

Unidades convencionales:

Factores de conversión: ng/mL

Valores de referencia:

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica:

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** CA 19.9 (líq. ascítico)**Código Unificado Andaluz:** CLC20068**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica:** Disponible de lunes a viernes**Tiempo de respuesta:** 8 horas**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** L.ascítico**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 200 µl**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** U/mL**Valores de referencia:****DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Proteína beta-Amiloide (LCR)**Código Unificado Andaluz:** CLC20077**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específicos:** Disponible de lunes a viernes**Tiempo de respuesta:** 8 horas**Volante de petición:** cociente tTAU/Abeta >**¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** CONSULTA ALZHEIMER**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** LCR**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 200 µl**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** pg/mL**Valores de referencia:****DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:**

Proteína Tau (LCR)

Código Unificado Andaluz:

CLC20078

Disponible para:

Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específica

Disponible de lunes a viernes

Tiempo de respuesta

8 horas

Volante de petición

>300 es positivo y <300 negativo

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?

NO

DEL PACIENTE**Periodo de ayuno anterior a prueba**

NO

Dieta previa a la prueba

NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba

NO

Otras consideraciones

CONSULTA ALZHEIMER

DEL ESPÉCIMEN**Tipo de espécimen**

LCR

Tipo de contenedor

Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo

200 µl

Conservante

NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra**Observaciones a la toma del espécimen****Recomendaciones para transporte** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones****DEL RESULTADO****Unidades internacionales****Unidades convencionales****Factores de conversión**

pg/mL

Valores de referencia

No establece un resultado positivo el diagnóstico de la enfermedad hay que

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:

Sinónimos: "Hematíes (recuento; líq. ascítico)"

Código Unificado Andaluz: CLC20087

Disponible para: Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específica: Disponible 24 horas de lunes a domingo

Tiempo de respuesta: 1 hora

Volante de petición

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos? NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba: NO

Dieta previa a la prueba: NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba: NO

Otras consideraciones: NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen: L.ascítico

Tipo de contenedor: Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo: 200 µl

Conservante: NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:

Observaciones a la toma del espécimen:

Recomendaciones para transporte: En mano (no en tubo neumático)

Otras consideraciones:

DEL RESULTADO

Unidades internacionales:

Unidades convencionales:

Factores de conversión: hem/µL

Valores de referencia:

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica:

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:

Sinónimos: "Leucocitos (recuento; líq. ascítico)"

Código Unificado Andaluz: CLC20088

Disponible para: Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específica: Disponible 24 horas de lunes a domingo

Tiempo de respuesta: 1 hora

Volante de petición

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos? NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba: NO

Dieta previa a la prueba: NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba: NO

Otras consideraciones: NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen: L.ascitico

Tipo de contenedor: Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo: 200 ul

Conservante: NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:

Observaciones a la toma del espécimen:

Recomendaciones para transporte: En mano (no en tubo neumático)

Otras consideraciones:

DEL RESULTADO

Unidades internacionales:

Unidades convencionales:

Factores de conversión: leu/ μ L

Valores de referencia:

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica:

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:

Sinónimos: "Polimorfonucleares (porcentaje; líq. ascítico)"

Código Unificado Andaluz: CLC20089

Disponible para: Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específica: Disponible 24 horas de lunes a domingo

Tiempo de respuesta: 1 hora

Volante de petición:

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos? NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba: NO

Dieta previa a la prueba: NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba: NO

Otras consideraciones: NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen: L.ascítico

Tipo de contenedor: Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo: 200 µl

Conservante: NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:

Observaciones a la toma del espécimen:

Recomendaciones para transporte: En mano (no en tubo neumático)

Otras consideraciones:

DEL RESULTADO

Unidades internacionales:

Unidades convencionales:

Factores de conversión: %

Valores de referencia:

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica:

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:

Sinónimos: "Mononucleares (porcentaje; líq. ascítico)"

Código Unificado Andaluz: CLC20090

Disponible para: Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específica: Disponible 24 horas de lunes a domingo

Tiempo de respuesta: 1 hora

Volante de petición

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos? NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba: NO

Dieta previa a la prueba: NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba: NO

Otras consideraciones: NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen: L.ascítico

Tipo de contenedor: Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo: 200 µl

Conservante: NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:

Observaciones a la toma del espécimen:

Recomendaciones para transporte: En mano (no en tubo neumático)

Otras consideraciones:

DEL RESULTADO

Unidades internacionales:

Unidades convencionales:

Factores de conversión: %

Valores de referencia:

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica:

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:

Sinónimos: "Leucocitos, no especificados (porcentaje; líq. ascítico)"

Código Unificado Andaluz: CLC20091

Disponible para: Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específicos: Disponible 24 horas de lunes a domingo

Tiempo de respuesta: 8 hora

Volante de petición:

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos? NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba: NO

Dieta previa a la prueba: NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba: NO

Otras consideraciones: NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen: L.ascítico

Tipo de contenedor: Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo: 200 ul

Conservante: NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:

Observaciones a la toma del espécimen:

Recomendaciones para transporte: En mano (no en tubo neumático)

Otras consideraciones:

DEL RESULTADO

Unidades internacionales:

Unidades convencionales:

Factores de conversión: %

Valores de referencia:

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica:

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Glucosa (LCR)**Código Unificado Andaluz:** CLC20096**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica:** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Tiempo de respuesta:** 1 hora**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** LCR**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 200 µl**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** mg/dL**Valores de referencia:** Las fluctuaciones observadas en las concentraciones glucémicas de individuo**DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:**

Cloro (LCR)

Código Unificado Andaluz:

CLC20098

Disponible para:

Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específicos

Disponible 24 horas de lunes a domingo

Tiempo de respuesta

8 horas

Volante de petición**¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?**

NO

DEL PACIENTE**Periodo de ayuno anterior a prueba**

NO

Dieta previa a la prueba

NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba

NO

Otras consideraciones

NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN**Tipo de espécimen**

LCR

Tipo de contenedor

Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo

200 µl

Conservante

NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra**Observaciones a la toma del espécimen****Recomendaciones para transporte**

En mano (no en tubo neumático)

Otras consideraciones**DEL RESULTADO****Unidades internacionales****Unidades convencionales****Factores de conversión**

mEq/L

Valores de referencia

Sirven para mantener la presión osmótica, la hidratación de los diversos co

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Adenosina desaminasa (LCR)**Código Unificado Andaluz:** CLC20099**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica:** Disponible de lunes a viernes**Tiempo de respuesta:** 8 horas**Volante de petición:** 0 a 9 U/L**¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** LCR**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 200 µl**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:** U/L**Unidades convencionales:****Factores de conversión:** U/L**Valores de referencia:** Es una enzima catalizadora de la reacción desaminasa de la adenosina en i**DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Lactato deshidrogenasa (LCR)**Código Unificado Andaluz:** CLC20100**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específicos:** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Tiempo de respuesta:** 1 hora**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** LCR**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 1ml**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** U/L**Valores de referencia:****DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:

Sinónimos: Inmunoglobulina G (LCR)

Código Unificado Andaluz: CLC20101

Disponible para: Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específica: Disponible 24 horas de lunes a domingo

Tiempo de respuesta: 1 hora

Volante de petición: Hasta 0,13

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos? NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba: NO

Dieta previa a la prueba: NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba: NO

Otras consideraciones: NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen: LCR

Tipo de contenedor: Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo: 1ml

Conservante: NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:

Observaciones a la toma del espécimen:

Recomendaciones para transporte: En mano (no en tubo neumático)

Otras consideraciones:

DEL RESULTADO

Unidades internacionales:

Unidades convencionales:

Factores de conversión: mg/dL

Valores de referencia: La IgG favorece la fagocitosis y activa el complemento.

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica:

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:

Sinónimos: Albúmina (LCR)

Código Unificado Andaluz: CLC20103

Disponible para: Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específica: Disponible 24 horas de lunes a domingo

Tiempo de respuesta: 1 hora

Volante de petición

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos? NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba: NO

Dieta previa a la prueba: NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba: NO

Otras consideraciones: NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen: LCR

Tipo de contenedor: Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo: 200 µl

Conservante: NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:

Observaciones a la toma del espécimen:

Recomendaciones para transporte: En mano (no en tubo neumático)

Otras consideraciones:

DEL RESULTADO

Unidades internacionales:

Unidades convencionales:

Factores de conversión: mg/dL

Valores de referencia: Sus funciones biológicas primarias consisten en transportar y almacenar un

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica:

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:

Sinónimos: "Hematies (recuento; LCR)"

Código Unificado Andaluz: CLC20122

Disponible para: Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específica: Disponible 24 horas de lunes a domingo

Tiempo de respuesta: 1 hora

Volante de petición

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos? NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba: NO

Dieta previa a la prueba: NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba: NO

Otras consideraciones: NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen: LCR

Tipo de contenedor: Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo: 200 µl

Conservante: NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:

Observaciones a la toma del espécimen:

Recomendaciones para transporte: En mano (no en tubo neumático)

Otras consideraciones:

DEL RESULTADO

Unidades internacionales:

Unidades convencionales:

Factores de conversión: hem/µL

Valores de referencia: El análisis de líquido cefalorraquídeo es indispensable para diagnosticar nu

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica:

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:

Sinónimos: "Leucocitos (recuento; LCR)"

Código Unificado Andaluz: CLC20123

Disponible para: Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específica: Disponible 24 horas de lunes a domingo

Tiempo de respuesta: 1 hora

Volante de petición: <10

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos? NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba: NO

Dieta previa a la prueba: NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba: NO

Otras consideraciones: NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen: LCR

Tipo de contenedor: Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo: 200 µl

Conservante: NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:

Observaciones a la toma del espécimen:

Recomendaciones para transporte: En mano (no en tubo neumático)

Otras consideraciones:

DEL RESULTADO

Unidades internacionales:

Unidades convencionales:

Factores de conversión: leu/µL

Valores de referencia: El análisis de líquido cefalorraquídeo es indispensable para diagnosticar nu

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica:

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:

Sinónimos: "Polimorfonucleares (porcentaje; LCR)"

Código Unificado Andaluz: CLC20124

Disponible para: Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específica: Disponible 24 horas de lunes a domingo

Tiempo de respuesta: 1 hora

Volante de petición

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos? NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba: NO

Dieta previa a la prueba: NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba: NO

Otras consideraciones: NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen: LCR

Tipo de contenedor: Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo: 200 µl

Conservante: NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:

Observaciones a la toma del espécimen:

Recomendaciones para transporte: En mano (no en tubo neumático)

Otras consideraciones:

DEL RESULTADO

Unidades internacionales:

Unidades convencionales:

Factores de conversión: %

Valores de referencia:

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica:

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:

Sinónimos: "Mononucleares (porcentaje; LCR)"

Código Unificado Andaluz: CLC20125

Disponible para: Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específica: Disponible 24 horas de lunes a domingo

Tiempo de respuesta: 1 hora

Volante de petición

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos? SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba: SI

Dieta previa a la prueba: NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba: NO

Otras consideraciones: NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen: LCR

Tipo de contenedor: Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo: 200 µl

Conservante: NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:

Observaciones a la toma del espécimen:

Recomendaciones para transporte: En mano (no en tubo neumático)

Otras consideraciones:

DEL RESULTADO

Unidades internacionales:

Unidades convencionales:

Factores de conversión: %

Valores de referencia:

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica:

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Glucosa (líq. pericárdico)**Código Unificado Andaluz:** CLC20131**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica:** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Tiempo de respuesta:** 1 hora**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** L.peritoneal**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 200 ul**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** mg/dL**Valores de referencia:** Las fluctuaciones observadas en las concentraciones glucémicas de individuo**DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:

Sinónimos: Proteínas totales (líq. pericárdico)

Código Unificado Andaluz: CLC20132

Disponible para: Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específica: Disponible 24 horas de lunes a domingo

Tiempo de respuesta: 8 horas

Volante de petición

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos? NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba: NO

Dieta previa a la prueba: NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba: NO

Otras consideraciones: NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen: L.pericardico

Tipo de contenedor: Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo: 200 ul

Conservante: NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:

Observaciones a la toma del espécimen:

Recomendaciones para transporte: En mano (no en tubo neumático)

Otras consideraciones:

DEL RESULTADO

Unidades internacionales:

Unidades convencionales:

Factores de conversión: g/dL

Valores de referencia:

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica:

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:

Sinónimos: "Hematies (recuento; líq. pericárdico)"

Código Unificado Andaluz: CLC20137

Disponible para: Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específica: Disponible 24 horas de lunes a domingo

Tiempo de respuesta: 1 hora

Volante de petición

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos? NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba: NO

Dieta previa a la prueba: NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba: NO

Otras consideraciones: NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen: L.pericárdico

Tipo de contenedor: Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo: 200 µl

Conservante: NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:

Observaciones a la toma del espécimen:

Recomendaciones para transporte: En mano (no en tubo neumático)

Otras consideraciones:

DEL RESULTADO

Unidades internacionales:

Unidades convencionales:

Factores de conversión: hem/µL

Valores de referencia:

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica:

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:

Sinónimos: "Leucocitos (recuento; líq. pericárdico)"

Código Unificado Andaluz: CLC20138

Disponible para: Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específica: Disponible 24 horas de lunes a domingo

Tiempo de respuesta: 1 hora

Volante de petición

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos? NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba: NO

Dieta previa a la prueba: NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba: NO

Otras consideraciones: NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen: L.pericardico

Tipo de contenedor: Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo: 200 ul

Conservante: NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:

Observaciones a la toma del espécimen:

Recomendaciones para transporte: En mano (no en tubo neumático)

Otras consideraciones:

DEL RESULTADO

Unidades internacionales:

Unidades convencionales:

Factores de conversión: leu/ μ L

Valores de referencia:

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica:

"Polimorfonucleares (porcentaje; líq. pericárdico)"

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:

Sinónimos: "Polimorfonucleares (porcentaje; líq. pericárdico)"

Código Unificado Andaluz: CLC20139

Disponible para: Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específica: Disponible 24 horas de lunes a domingo

Tiempo de respuesta: 1 hora

Volante de petición

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos? NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba: NO

Dieta previa a la prueba: NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba: NO

Otras consideraciones: NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen: L.pericardico

Tipo de contenedor: Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo: 200 ul

Conservante: NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:

Observaciones a la toma del espécimen:

Recomendaciones para transporte: En mano (no en tubo neumático)

Otras consideraciones:

DEL RESULTADO

Unidades internacionales:

Unidades convencionales:

Factores de conversión: %

Valores de referencia:

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica:

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:

Sinónimos: "Mononucleares (porcentaje; líq. pericárdico)"

Código Unificado Andaluz: CLC20140

Disponible para: Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específica: Disponible 24 horas de lunes a domingo

Tiempo de respuesta: 1 hora

Volante de petición

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos? NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba: NO

Dieta previa a la prueba: NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba: NO

Otras consideraciones: NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen: L.pericardico

Tipo de contenedor: Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo: 200 ul

Conservante: NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:

Observaciones a la toma del espécimen:

Recomendaciones para transporte: En mano (no en tubo neumático)

Otras consideraciones:

DEL RESULTADO

Unidades internacionales:

Unidades convencionales:

Factores de conversión: %

Valores de referencia:

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica:

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:

Sinónimos: Colesterol (líq. ascítico)

Código Unificado Andaluz: CLC20145

Disponible para: Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específica: Disponible de lunes a viernes

Tiempo de respuesta: 8 horas

Volante de petición

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos? NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba: NO

Dieta previa a la prueba: NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba: NO

Otras consideraciones: NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen: L.ascítico

Tipo de contenedor: Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo: 200 ul

Conservante: NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:

Observaciones a la toma del espécimen:

Recomendaciones para transporte: En mano (no en tubo neumático)

Otras consideraciones:

DEL RESULTADO

Unidades internacionales:

Unidades convencionales:

Factores de conversión: mg/dL

Valores de referencia: El colesterol, sintetizado en todo el cuerpo, es un componente esencial de l

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica:

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** pH (líq. pleural)**Código Unificado Andaluz:** CLC20146**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica:** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Tiempo de respuesta:** 1 hora**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** L.pleural**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 200 µl**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:****Valores de referencia:****DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Glucosa (líq. pleural)**Código Unificado Andaluz:** CLC20147**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica:** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Tiempo de respuesta:** 1 hora**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** L.Pleural**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 200 ul**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** mg/dL**Valores de referencia:** Las fluctuaciones observadas en las concentraciones glucémicas de individuo**DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:

Sinónimos: Proteínas totales (líq. pleural)

Código Unificado Andaluz: CLC20148

Disponible para: Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específica: Disponible 24 horas de lunes a domingo

Tiempo de respuesta: 8 horas

Volante de petición

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos? NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba: NO

Dieta previa a la prueba: NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba: NO

Otras consideraciones: NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen: L.pleural

Tipo de contenedor: Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo: 200 µl

Conservante: NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:

Observaciones a la toma del espécimen:

Recomendaciones para transporte: En mano (no en tubo neumático)

Otras consideraciones:

DEL RESULTADO

Unidades internacionales:

Unidades convencionales:

Factores de conversión: g/dL

Valores de referencia:

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica:

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:

Sinónimos: Albúmina (líq. pleural)

Código Unificado Andaluz: CLC20149

Disponible para: Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específica: Disponible 24 horas de lunes a domingo

Tiempo de respuesta: 1 hora

Volante de petición

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos? NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba: NO

Dieta previa a la prueba: NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba: NO

Otras consideraciones: NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen: L.Pleural

Tipo de contenedor: Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo: 200 ul

Conservante: NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:

Observaciones a la toma del espécimen:

Recomendaciones para transporte: En mano (no en tubo neumático)

Otras consideraciones:

DEL RESULTADO

Unidades internacionales:

Unidades convencionales:

Factores de conversión: g/dL

Valores de referencia: Sus funciones biológicas primarias consisten en transportar y almacenar un

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica:

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Lactato deshidrogenasa (líq. pleural)**Código Unificado Andaluz:** CLC20150**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica:** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Tiempo de respuesta:** 1 hora**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** L.pleural**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 1ml**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** U/L**Valores de referencia:****DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:

Sinónimos: Colesterol (líq. pleural)

Código Unificado Andaluz: CLC20152

Disponible para: Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específica: Disponible de lunes a viernes

Tiempo de respuesta: 8 horas

Volante de petición:

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos? NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba: NO

Dieta previa a la prueba: NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba: NO

Otras consideraciones: NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen: L.pleural

Tipo de contenedor: Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo: 200 µl

Conservante: NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:

Observaciones a la toma del espécimen:

Recomendaciones para transporte: En mano (no en tubo neumático)

Otras consideraciones:

DEL RESULTADO

Unidades internacionales:

Unidades convencionales:

Factores de conversión: mg/dL

Valores de referencia: El colesterol, sintetizado en todo el cuerpo, es un componente esencial de l

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica:

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Trigliceridos (líq. pleural)**Código Unificado Andaluz:** CLC20153**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica:** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Tiempo de respuesta:** Disponible 24 horas de lunes a domingo**Volante de petición****¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** SI**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** orina**Tipo de contenedor:** Tubo de tapón amarillo,**Volumen mínimo:** 2 ml**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** Refrigerado**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** mg/dL**Valores de referencia:****DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:

Sinónimos: alfa-Amilasa (líq. pleural)

Código Unificado Andaluz: CLC20154

Disponible para: Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específica: Disponible 24 horas de lunes a domingo

Tiempo de respuesta: 1 hora

Volante de petición

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos? NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba: NO

Dieta previa a la prueba: NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba: NO

Otras consideraciones: NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen: L.pleural

Tipo de contenedor: Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo: 200 ul

Conservante: NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:

Observaciones a la toma del espécimen:

Recomendaciones para transporte: En mano (no en tubo neumático)

Otras consideraciones:

DEL RESULTADO

Unidades internacionales:

Unidades convencionales:

Factores de conversión: U/L

Valores de referencia: Las amilasas son un grupo de hidrolasas que degradan los carbohidratos c

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica:

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA**Nombre SI:****Sinónimos:** Adenosina desaminasa (líq. pleural)**Código Unificado Andaluz:** CLC20155**Disponible para:** Urgencias y Atención Especializada**Días/horas de recepción específica:** Disponible de lunes a viernes**Tiempo de respuesta:** 8 horas**Volante de petición:** 0 a 30 U/L**¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?** NO**DEL PACIENTE****Periodo de ayuno anterior a prueba:** NO**Dieta previa a la prueba:** NO**Supresión de fármacos anterior a la prueba:** NO**Otras consideraciones:** NINGUNA**DEL ESPÉCIMEN****Tipo de espécimen:** LIQUIDO PLEURAL**Tipo de contenedor:** Tubo 10 mL tapón verde**Volumen mínimo:** 200 ul**Conservante:** NO**Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:****Observaciones a la toma del espécimen:****Recomendaciones para transporte:** En mano (no en tubo neumático)**Otras consideraciones:****DEL RESULTADO****Unidades internacionales:****Unidades convencionales:****Factores de conversión:** U/L**Valores de referencia:** Es una enzima catalizadora de la reacción desaminasa de la adenosina en i**DEL PARÁMETRO****Utilidad Clínica:**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:

Sinónimos: Antígeno carcinoembrionario (líq. pleural)

Código Unificado Andaluz: CLC20156

Disponible para: Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específica: Disponible de lunes a viernes

Tiempo de respuesta: 2 horas

Volante de petición:

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos? NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba: NO

Dieta previa a la prueba: NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba: NO

Otras consideraciones: NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen: L.pleural

Tipo de contenedor: Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo: 200 µl

Conservante: NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:

Observaciones a la toma del espécimen:

Recomendaciones para transporte: En mano (no en tubo neumático)

Otras consideraciones:

DEL RESULTADO

Unidades internacionales:

Unidades convencionales:

Factores de conversión: ng/mL

Valores de referencia:

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica:

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:

Sinónimos: "Leucocitos (recuento; líq. diálisis peritoneal)"

Código Unificado Andaluz: CLC20157

Disponible para: Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específica: Disponible 24 horas de lunes a domingo

Tiempo de respuesta: 1 hora

Volante de petición:

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos? NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba: NO

Dieta previa a la prueba: NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba: NO

Otras consideraciones: NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen: L.peritoneal

Tipo de contenedor: Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo: 200 µl

Conservante: NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:

Observaciones a la toma del espécimen:

Recomendaciones para transporte: En mano (no en tubo neumático)

Otras consideraciones:

DEL RESULTADO

Unidades internacionales:

Unidades convencionales:

Factores de conversión: leu/µL

Valores de referencia:

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica:

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:

Sinónimos: "Polimorfonucleares (porcentaje; líq. diálisis peritoneal)"

Código Unificado Andaluz: CLC20158

Disponible para: Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específica: Disponible 24 horas de lunes a domingo

Tiempo de respuesta: 1 hora

Volante de petición:

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos? NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba: NO

Dieta previa a la prueba: NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba: NO

Otras consideraciones: NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen: L.peritoneal

Tipo de contenedor: Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo: 200 ul

Conservante: NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:

Observaciones a la toma del espécimen:

Recomendaciones para transporte: En mano (no en tubo neumático)

Otras consideraciones:

DEL RESULTADO

Unidades internacionales:

Unidades convencionales:

Factores de conversión: %

Valores de referencia:

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica:

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:

Sinónimos: "Mononucleares (porcentaje; líq. diálisis peritoneal)"

Código Unificado Andaluz: CLC20159

Disponible para: Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específica: Disponible 24 horas de lunes a domingo

Tiempo de respuesta: 1 hora

Volante de petición:

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos? NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba: NO

Dieta previa a la prueba: NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba: NO

Otras consideraciones: NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen: L.peritoneal

Tipo de contenedor: Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo: 200 ul

Conservante: NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:

Observaciones a la toma del espécimen:

Recomendaciones para transporte: En mano (no en tubo neumático)

Otras consideraciones:

DEL RESULTADO

Unidades internacionales:

Unidades convencionales:

Factores de conversión: %

Valores de referencia:

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica:

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:

Sinónimos: "Hematies (recuento; líq. pleural)"

Código Unificado Andaluz: CLC20167

Disponible para: Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específica: Disponible 24 horas de lunes a domingo

Tiempo de respuesta: 1 hora

Volante de petición

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos? NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba: NO

Dieta previa a la prueba: NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba: NO

Otras consideraciones: NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen: L.pleural

Tipo de contenedor: Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo: 200 µl

Conservante: NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:

Observaciones a la toma del espécimen:

Recomendaciones para transporte: En mano (no en tubo neumático)

Otras consideraciones:

DEL RESULTADO

Unidades internacionales:

Unidades convencionales:

Factores de conversión: hem/µL

Valores de referencia:

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica:

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:

Sinónimos: "Leucocitos (recuento; líq. pleural)"

Código Unificado Andaluz: CLC20168

Disponible para: Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específica: Disponible 24 horas de lunes a domingo

Tiempo de respuesta: 1 hora

Volante de petición

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos? NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba: NO

Dieta previa a la prueba: NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba: NO

Otras consideraciones: NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen: L.pleural

Tipo de contenedor: Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo: 200 µl

Conservante: NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:

Observaciones a la toma del espécimen:

Recomendaciones para transporte: En mano (no en tubo neumático)

Otras consideraciones:

DEL RESULTADO

Unidades internacionales:

Unidades convencionales:

Factores de conversión: leu/µL

Valores de referencia:

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica:

"Polimorfonucleares (porcentaje; líq. pleural)"

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:

Sinónimos: "Polimorfonucleares (porcentaje; líq. pleural)"

Código Unificado Andaluz: CLC20169

Disponible para: Urgencias y Atención Especializada

Días/horas de recepción específica: Disponible 24 horas de lunes a domingo

Tiempo de respuesta: 1 hora

Volante de petición

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos? NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba: NO

Dieta previa a la prueba: NO

Supresión de fármacos anterior a la prueba: NO

Otras consideraciones: NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen: L.pleural

Tipo de contenedor: Tubo 10 mL tapón verde

Volumen mínimo: 200 µl

Conservante: NO

Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra:

Observaciones a la toma del espécimen:

Recomendaciones para transporte: En mano (no en tubo neumático)

Otras consideraciones:

DEL RESULTADO

Unidades internacionales:

Unidades convencionales:

Factores de conversión: %

Valores de referencia:

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica:

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	"Srm-PSA (cociente; fracción libre)"
Sinónimos:	PSA cociente
Código Unificado Andaluz:	CLC00822
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	12-24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI/NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	%
Factores de conversión	
Valores de referencia	Evaluación necesidad de la realización de biopsia para la detección de proc

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	? ANT
Sinónimos:	ALFA 1 ANTITRIPSINA
Código Unificado Andaluz:	CLC00645
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	90-200 mg/dl
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas.
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero. Plasma tratado con heparina de litio.
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	9-4-18 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	16,3
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dL
Valores de referencia	Deficit inmunitario de alfa 1 antitripsina, reactante de fase aguda positivo, i

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	g/L x 18,4 = µmol/L
-------------------------	---------------------

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	?-1-G AC
Sinónimos:	?-1-GLICOPROTEINA ACIDA
Código Unificado Andaluz:	CLC00632
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	50-120 mg/dl
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	Los niveles plasmáticos muestran un volumen triplicado o cuádruplicado en

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	ACMA 708
Sinónimos:	CETONAS, CUERPOS CETONICOS orina
Código Unificado Andaluz:	CLC00123
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	Valores < 7,5 mg/dl: NEGATIVO
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	La toma de aspirina o de L-DOPA a dosis altas puede inducir falsos positivos.

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Orina (primera micción)
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	REFRIGERAR
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	La cetonuria (presencia de cuerpos cetónicos en orina) se da en situacione

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	ACMA 708
Sinónimos:	"Cuerpos cetónicos (orina; tira color)"
Código Unificado Andaluz:	CLC00123
Disponible para:	Urgencias y Atención Especializada
Días/horas de recepción específica	Disponible 24 horas de lunes a domingo
Tiempo de respuesta	1 hora
Volante de petición	<7,5 mg/dl: NEGATIVO
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	PRIMERA ORINA DE LA MAÑANA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Orina (primera micción)
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 ml
Conservante	NO
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dL
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	AGRHEM
Sinónimos:	Agregados de Hematíes
Código Unificado Andaluz:	BA00017
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	No presencia
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	REFRIGERAR
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	ALB
Sinónimos:	ALBUMINA
Código Unificado Andaluz:	CLC00606
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	"SUERO: Adultos (3,5 - 5,2 g/dl); RN hasta 4 días (2,8-4,4 g/dl)"
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas.
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	ACOSTARSE 1 HORA ANTES DE RECOGER LA MUESTRA, DE PIE > CONCENTRACION DE ALB

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO O PLASMA (heparina Li /EDTA), NO EMPLEAR CITRATO NI OXALAT
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	2-4-4 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	4,2
Unidades convencionales	
Factores de conversión	g/dL
Valores de referencia	mantenimiento de la presión oncótica y transporte

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	$\text{g/L} \times 15,2 = \mu\text{mol/L}$ $\mu\text{mol/L} \times 0,0658 = \text{g/Lg/L} \times 0,1 = \text{g/Dl}$
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	ALB/CR
Sinónimos:	ALBUMINA/CREATININA ORINA
Código Unificado Andaluz:	CLC01018
Disponible para:	Atención primaria y Atención especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	"Adultos: < 20 mg de albúmina/g de creatinina ;Niños (3-5 años): <20 mg
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	9 µl
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg de albumina/ g de creatinina
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	ALBOR
Sinónimos:	ALBUMINA ELIMINADA EN ORINA
Código Unificado Andaluz:	CLC01019
Disponible para:	Atención primaria y Atención especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA 24H
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2μ
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/24 h
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	ALBOR24
Sinónimos:	ALBUMINA ORINA 24 HORAS
Código Unificado Andaluz:	CLC01220
Disponible para:	Atención primaria y Atención especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA 24H
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2μ
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dL
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	ALD
Sinónimos:	FRUCTOSA-BIFOSFATO ALDOLASA
Código Unificado Andaluz:	CLC00587
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	? 7.6 U/L (37 °C)? 3.1 U/L (25 °C)
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas.
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero Plasma tratado con heparina de litio y EDTA bipotásico
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	U/L
Valores de referencia	Las determinaciones de aldolasa en suero han tenido el mayor interés clínic

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	AMI
Sinónimos:	AMILASA, ? AMILASA
Código Unificado Andaluz:	CLC00579
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	1-24h
Volante de petición	Suero/plasma Hombres/mujeres 22-80 U/L
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	Se observan incrementos inespecíficos con drogas que producen constricción
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero. Plasma tratado con heparina de litio.
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	4 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	Evitar el plasma que utilice ácido edético, el oxalato y el citrato
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	28,3
Unidades convencionales	
Factores de conversión	U/L
Valores de referencia	La ?-amilasa se determina principalmente para diagnosticar y controlar la p

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	U/L x 0,0167 = µkat/L
-------------------------	-----------------------

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	AMIO
Sinónimos:	AMILASA EN ORINA
Código Unificado Andaluz:	CLC01002
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1-24h
Volante de petición	42 – 321 U/L
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	4µl
Conservante	No emplear aditivos para recoger la orina.
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	Ajustar el pH a aproximadamente 7 antes de almacenarla
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	46
Unidades convencionales	
Factores de conversión	U/L
Valores de referencia	La amilasuria aumenta en las pancreatitis, su valor diagnóstico no es super

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	U/L x 0,0167 = µkat/L
-------------------------	-----------------------

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	AMiOR
Sinónimos:	AMILASA ELIMINADA
Código Unificado Andaluz:	B02237
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	1-24h
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	4µl
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	U/24h
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	AMIOR 24
Sinónimos:	AMILASA ORINA 24 HORAS
Código Unificado Andaluz:	CLC01225
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1-24h
Volante de petición	42 – 321 U/L
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA 24H
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	4µl
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	Ajustar el pH a aproximadamente 7 antes de almacenarla
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	U/L
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	APO A
Sinónimos:	APOLIPOPROTEINA A1
Código Unificado Andaluz:	CLC00654
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	"Hombres 105-175 mg/dl; Mujeres 105-205mg/dl"
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas.
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero. Plasma tratado con heparina de litio y EDTA bipotásico
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	Se detecta una reducción de las concentraciones de Apo A1 en pacientes a

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	APO B
Sinónimos:	APOLIPOPROTEINA B
Código Unificado Andaluz:	CLC00655
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	"Hombres 60-140 mg/dl; Mujeres 55-130mg/dl"
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas.
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero. Plasma tratado con heparina de litio y EDTA bipotásico
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	Su forma mas abundante es la Apo B100 cuyo aumento se asocia a un agr

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	APRI
Sinónimos:	INDICE APRI
Código Unificado Andaluz:	BA00006
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas.
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero Plasma tratado con heparina de litio y EDTA bipotásico
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	ASLO
Sinónimos:	ANTIESTREPTOLISINA O
Código Unificado Andaluz:	CLC32653
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	Adultos hasta 200 UI/mL, Niños hasta 150 UI/mL
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas.
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero. Plasma tratado con heparina de litio y EDTA bipotásico
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	2 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	U/mL
Valores de referencia	La estreptolisina O es una hemolisina producida por estreptococos del grup

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	AU
Sinónimos:	ACIDO URICO, URATO
Código Unificado Andaluz:	CLC00505
Disponible para:	Atención primaria y Atención especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	"Hombres 3,5-7,2 mg/dl; Mujeres 2,6-6,0."
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero. Plasma tratado con heparina de litio y EDTA bipotásico
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	9 µl
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	17,6
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/ dl
Valores de referencia	Se determina en el diagnóstico y el tratamiento de numerosos trastornos r

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	"mg/dL x 59,5 = µmol/L; mg/dL x 10 = mg/L"
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	AUO
Sinónimos:	URATOS ORINA
Código Unificado Andaluz:	CLC00981
Disponible para:	Atención primaria y Atención especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	1ª orina de la mañana 37-92 mg/dL Orina de 24 horas: 200-1.000 mg/día ,c
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2μ
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	22,1
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/ dl
Valores de referencia	La uricosuria depende en primer lugar de la ingesta y en segundo lugar de

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	"mg/dL x 59,5 = μmol/L; mg/dL x 10 = mg/L"
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	AUO/CR
Sinónimos:	URATOS/CREATININA EN ORINA
Código Unificado Andaluz:	CLC00982
Disponible para:	Atención primaria y Atención especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	9 µl
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg de uratos/ g de creatinina
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	AUOR
Sinónimos:	URATOS ELIMINADOS ORINA
Código Unificado Andaluz:	CLC00983
Disponible para:	Atención primaria y Atención especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	"Orina de 24 horas: 200-1.000 mg/día ,correspondiente a 13-67 mg/dL (cal
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA 24H
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2μ
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	14,4
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/ 24h
Valores de referencia	La uricosuria depende en primer lugar de la ingesta y en segundo lugar del

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	AUOR24
Sinónimos:	URATOS ORINA 24 HORAS
Código Unificado Andaluz:	CLC00982
Disponible para:	Atención primaria y Atención especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA 24H
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	9 µl
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/ dl
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	B2M
Sinónimos:	BETA2 MICROGLOBULINA
Código Unificado Andaluz:	CLC00641
Disponible para:	Atención primaria y Atención especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	< 60 años 0,8 – 2,4 mg/L. > 60 años) ? 3,0 mg/L
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas.
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero. Plasma tratado con heparina de litio y EDTA bipotásico
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	2μ
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	18,3
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	Se han documentado niveles séricos elevados de ?2-M en presencia de nef

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	mg/L x 84,7 = nmol/L
-------------------------	----------------------

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	B2M O
Sinónimos:	BETA2 MICROGLOBULINA ORINA
Código Unificado Andaluz:	CLC02827
Disponible para:	Atención primaria y Atención especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	<200 µg/L
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA 24H
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2µ
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	µg/L
Valores de referencia	Se han documentado niveles séricos elevados de ?2-M en presencia de nef

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	BACTSED
Sinónimos:	Bacterias
Código Unificado Andaluz:	CLC00127
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	No presencia
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	REFRIGERAR
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	BACTSED
Sinónimos:	Bacteriuria
Código Unificado Andaluz:	CLC00127
Disponible para:	Urgencias y Atención Especializada
Días/horas de recepción específica	Disponible de lunes a viernes
Tiempo de respuesta	1 hora
Volante de petición	NO PRESENCIA
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	SI
Otras consideraciones	PRIMERA ORINA DE LA MAÑANA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Orina (primera micción)
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 ml
Conservante	NO
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	BD
Sinónimos:	BILIRRUBINA DIRECTA, bilirrubina conjugada
Código Unificado Andaluz:	CLC00523
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	< 0,2 mg/dL
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas./NO en petición urgente
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero. Plasma tratado con heparina de litio. EDTA bipotásico
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	9 µl
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	46,2
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	El incremento de los niveles de bilirrubina no conjugada (indirecta) en el to

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	µmol/L x 0,0585 = mg/Dl, mg/dL x 10 = mg/L, mg/dL x 17,1 = µmol/L
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	BI
Sinónimos:	BILIRRUBINA INDIRECTA
Código Unificado Andaluz:	CLC00524
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas./NO en petición urgente
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero. Plasma tratado con heparina de litio y EDTA bipotásico
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	9 µl
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	Es la diferencia entre la bilirrubina total y la bilirrubina directa

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	BMA
Sinónimos:	"Bilirrubina (orina; tira color)"
Código Unificado Andaluz:	CLC00121
Disponible para:	Urgencias y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicas	Disponible 24 horas de lunes a domingo
Tiempo de respuesta	1 hora
Volante de petición	No presencia
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	PRIMERA ORINA DE LA MAÑANA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Orina (primera micción)
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 ml
Conservante	NO
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales
Unidades convencionales
Factores de conversión
Valores de referencia

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	BMA
Sinónimos:	BILIRRUBINA ORINA, SISTEMATICO ORINA
Código Unificado Andaluz:	CLC00121
Disponible para:	Urgencias, Atención primaria y Atención especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	No presencia
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Orina (primera micción)
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 ml
Conservante	REFRIGERAR
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	Ictericia, anemia y enfermedades hemáticas y biliares. Marcador de enferm

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	BT
Sinónimos:	BILIRRUBINA TOTAL
Código Unificado Andaluz:	CLC00522
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	"Adultos 0,3 – 1,2 mg/dL. Niños: 0 – 1 día 1,4 – 8,7 mg/dL; 1 – 2 días 3,4
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas./NO en petición urgente
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero. Plasma tratado con heparina de litio o EDTA. (sin hemólisis ni lipemia)
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	2 µl
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	Evitense las muestras hemolizadas.
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	39
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	La obstrucción del conducto biliar o el daño de la estructura hepatocelular

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	µmol/L x 0,0585 = mg/Dl, mg/dL x 10 = mg/L, mg/dL x 17,1 = µmol/L
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	C
Sinónimos:	CREATININA
Código Unificado Andaluz:	CLC00504
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	Varón: 0,67 – 1,17 mg/dL Hembra 0,51 – 0,95 mg/dL Recién nacido 0,31 –
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas./NO en petición urgente
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	La cefoxitina proporciona resultados de creatinina falsamente aumentados.
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero.Plasma tratado con heparina de litio y EDTA bipotásico.
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	14,2
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	Las cuantificaciones de la creatinina se utilizan en el diagnóstico y el trata

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	"µmol/L x 0,0113 = mg/dL; µmol/L x 0,001 = mmol/L"
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	C3
Sinónimos:	COMPONENTE C3 DEL COMPLEMENTO
Código Unificado Andaluz:	CLC00552
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	90-180 mg/dL
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero. Plasma tratado con heparina de litio.
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	10 µl
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	15,6
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	Disminuye en numerosas enfermedades inflamatorias e infecciosas. lupus

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	"g/L × 100 = mg/Dl; mg/dL × 0,01 = g/L"
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	C4
Sinónimos:	COMPONENTE C4 DEL COMPLEMENTO
Código Unificado Andaluz:	CLC00563
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	10-40 mg/dL
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero. Plasma tratado con heparina de litio, EDTA bipotásico
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	15 µl
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	33,4
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	El C4 está disminuido o falta por completo en enfermedades del inmunoco

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	"g/L × 100 = mg/Dl; mg/dL × 0,01 = g/L"
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CA
Sinónimos:	CALCIO
Código Unificado Andaluz:	CLC00512
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específica	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1h-24 horas
Volante de petición	Niños (0-10 días): (7,6-10,4 mg/dL) Niños (10 días-2 años): (9,0-11,0 mg/dL)
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas./NO en petición urgente
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	Los fármacos que contienen sales de estronio pueden aumentar de forma s
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero, plasma heparina Li
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	3µl
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	2,8
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	El incremento de los niveles de PTH sérica o de vitamina D están generalm

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	Factores de conversión: mmol/L x 4,01 = mg/dL
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CA*
Sinónimos:	CALCIO CORREGIDO
Código Unificado Andaluz:	CLC00514
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1h-24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas./NO en petición urgente
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero, plasma heparina Li
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	3µl
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	Da un nivel estimado del nivel de calcio correcto si la albúmina fuera norm

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CAO
Sinónimos:	CALCIO EN ORINA
Código Unificado Andaluz:	CLC00993
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1h-24 horas
Volante de petición	100-300 mg/24 h), correspondientes a (6,8-21,3 mg/dl) con alimentación n
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	Los fármacos que contienen sales de estronio pueden aumentar de forma s
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2cc
Conservante	Recoger las muestras de orina en frascos lavados con ácido. Recoger las m
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	33,5
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	La hipercalcemia puede ser secundaria a hipercalcemia, como ocurre en el

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	Factores de conversión: mmol/L x 4,01 = mg/dL
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CAO/CR
Sinónimos:	CALCIO/CREATININA ORINA
Código Unificado Andaluz:	CLC00994
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	1h-24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas./NO en petición urgente
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	3µl
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg de calcio/ g de creatinina
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CAOR
Sinónimos:	CALCIO ELIMINADO EN ORINA
Código Unificado Andaluz:	CLC00996
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1h-24 horas
Volante de petición	100-300 mg/24h
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	Los fármacos que contienen sales de estronio pueden aumentar de forma s
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA 24h
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2cc
Conservante	Recoger las muestras de orina en frascos lavados con ácido. Recoger las m
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	27
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/24h
Valores de referencia	La hipercalcemia puede ser secundaria a hipercalcemia, como ocurre en el

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	Factores de conversión: mmol/L x 4,01 = mg/dL
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CAOR24
Sinónimos:	CALCIO ORINA 24 HORAS
Código Unificado Andaluz:	CLC01230
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	100-300 mg/24 h)
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA 24h
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2cc
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	La hipercalciuria puede ser secundaria a hipercalcemia, como ocurre en el

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Capacitación espermática (Inseminación)
Sinónimos:	Inseminación Artificial de Cónyuge
Código Unificado Andaluz:	BA02825
Disponible para:	Atención especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 9:00-10:00 horas.
Tiempo de respuesta	2 horas.
Volante de petición	>5 millones espermatozoides/mL de semen
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	No

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	No
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	No
Otras consideraciones	Higiene genital

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Semen
Tipo de contenedor	Contenedor estéril de boca ancha, Tubo cónico estéril de 12mL
Volumen mínimo	1 mL
Conservante	No Procede
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	No Procede
Observaciones a la toma del espécimen	"Abstinencia sexual 2-4 días; recoger la totalidad de la muestra directamente en el envase "
Recomendaciones para transporte	Envolver envase con papel aluminio y entregar antes de transcurrir 45min
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	Millones de espermatozoides/mL de semen
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Capacitación espermática (Inseminación)
Sinónimos:	Inseminación Artificial de Donante
Código Unificado Andaluz:	BA02825
Disponible para:	Atención especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de antes de las 10:00 horas.
Tiempo de respuesta	2 horas.
Volante de petición	>5 millones espermatozoides/mL de semen
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	No

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	No
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	No
Otras consideraciones	Higiene genital

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Semen
Tipo de contenedor	Pajuela
Volumen mínimo	0,5 mL
Conservante	Agente Crioprotector
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	No Procede
Observaciones a la toma del espécimen	No Procede
Recomendaciones para transporte	Remitir la muestra en Nitrógeno Líquido
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	Millones de espermatozoides/mL de semen
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Capacitación espermática (Punción folicular)
Sinónimos:	Semen de Cónyuge para FIV
Código Unificado Andaluz:	BA02826
Disponible para:	Atención especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:00-10:00 horas.
Tiempo de respuesta	8-24 horas.
Volante de petición	>0,1 millones espermatozoides/mL de semen
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	No

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	No
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	No
Otras consideraciones	Higiene genital

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Semen
Tipo de contenedor	Contenedor estéril de boca ancha, Tubo cónico estéril de 12mL
Volumen mínimo	1 mL
Conservante	No procede
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	No Procede
Observaciones a la toma del espécimen	"Abstinencia sexual 2-4 días; recoger la totalidad de la muestra directamente en el envase "
Recomendaciones para transporte	Envolver envase con papel aluminio y entregar antes de transcurrir 45min
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	Millones de espermatozoides/mL de semen
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Capacitación espermática (Punción folicular)
Sinónimos:	Semen de Donante para FIV
Código Unificado Andaluz:	BA02826
Disponible para:	Atención especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de antes de las 10:00 horas.
Tiempo de respuesta	8-24 horas.
Volante de petición	>0,1 millones espermatozoides/mL de semen
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	No

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	No
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	No
Otras consideraciones	No Procede

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Semen
Tipo de contenedor	Pajuela
Volumen mínimo	0,5 mL
Conservante	Agente Crioprotector
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	No Procede
Observaciones a la toma del espécimen	No procede
Recomendaciones para transporte	Remitir la muestra en Nitrógeno Líquido
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	Millones de espermatozoides/mL de semen
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CCRR
Sinónimos:	Sangre oculta (cribado)
Código Unificado Andaluz:	CLC03644
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1 día
Volante de petición	Negativo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Heces
Tipo de contenedor	Tubo colector con buffer específico para esta prueba
Volumen mínimo	
Conservante	REFRIGERAR
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	Cualitativo
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CELNEOP
Sinónimos:	Células neoplásicas
Código Unificado Andaluz:	CLC00131
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	No presencia
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	REFRIGERAR
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CELNOES
Sinónimos:	Células no escamosas
Código Unificado Andaluz:	BA02004
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	No presencia
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	REFRIGERAR
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CELPLAN
Sinónimos:	Células epiteliales planas
Código Unificado Andaluz:	CLC00128
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	No presencia
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	REFRIGERAR
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CELPROS
Sinónimos:	Células prostáticas
Código Unificado Andaluz:	BA02847
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	No presencia
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	REFRIGERAR
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CELREN
Sinónimos:	Celulas renales
Código Unificado Andaluz:	BA00018
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	No presencia
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	REFRIGERAR
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CELTRAN
Sinónimos:	Células epiteliales de transición
Código Unificado Andaluz:	CLC00129
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	No presencia
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	REFRIGERAR
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CELTUBR
Sinónimos:	Células epiteliales de túbulo renal
Código Unificado Andaluz:	CLC00130
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	No presencia
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	REFRIGERAR
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CER
Sinónimos:	CERULOPLASMINA
Código Unificado Andaluz:	CLC00628
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	20-60 mg/dl
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas.
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	EL INTRALIPID provoca resultados de ceruloplasmina falsamente elevados
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	suero, plasma heparina Li
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	11,1
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	Concentraciones disminuidas de ceruloplasmina se encuentran en la degen

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	$\text{mg/dL} \times 0,01 = \text{g/L}$ $\text{g/L} \times 100 = \text{mg/dL}$ $\text{g/L} \times 7,46 = \mu\text{mol/L}$ $\text{mg/dL} \times 0,0746 = \mu\text{mol/L}$
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CHE
Sinónimos:	COLINESTERASA
Código Unificado Andaluz:	CLC00554
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	"Hombres: 5300-12900U/L; MUJERES: 4300-11200 U/L"
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas./NO en petición urgente
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero, plasma EDTA, LIBRES DE HEMOLISIS
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	10,4
Unidades convencionales	
Factores de conversión	U/L
Valores de referencia	indicador de la intoxicación por insecticidas organofosforados, también se

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	$U/L \times 0,0167 = \mu\text{kat/L}$ $\mu\text{kat/L} \times 60 = U/L$ $U/L \times 0,001 = kU/L$ $\mu\text{kat/L} \times 0,06 = kU/L$
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CHED
Sinónimos:	COLINESTERASA DIBUCAINA
Código Unificado Andaluz:	BA00430
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas./NO en petición urgente
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	suero, plasma EDTA, LIBRES DE HEMOLISIS
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	U/L
Valores de referencia	se emplea para detectar variantes hereditarias atípicas de la enzima que h

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	$U/L \times 0,0167 = \mu\text{kat}/L$ $\mu\text{kat}/L \times 60 = U/L$ $U/L \times 0,001 = kU/L$ $\mu\text{kat}/L \times 0,06 = kU/L$
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Ciclo FIV/ICSI COMPLETO
Sinónimos:	Preservación fertilidad (ovocitos)
Código Unificado Andaluz:	RHA90
Disponible para:	Atención especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:00-9:00 horas.
Tiempo de respuesta	8 horas.
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	No

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Sí
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	No
Otras consideraciones	Ayuno de 8 horas mínimo, tratamiento hormonal, Higiene genital

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Ovocitos
Tipo de contenedor	Cryotop
Volumen mínimo	No Procede
Conservante	Medios de vitrificación
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	No Procede
Observaciones a la toma del espécimen	Condiciones de esterilidad
Recomendaciones para transporte	No Procede
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Ciclo FIV/ICSI COMPLETO
Sinónimos:	Punción folicular
Código Unificado Andaluz:	RHA90
Disponible para:	Atención especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:00-9:00 horas.
Tiempo de respuesta	24 horas-2 semanas.
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	No

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Sí
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	No
Otras consideraciones	Ayuno de 8 horas mínimo, tratamiento hormonal, Higiene genital

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Ovocitos
Tipo de contenedor	Placas de cultivo específicas
Volumen mínimo	No Procede
Conservante	Medios de cultivo específicos
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	No Procede
Observaciones a la toma del espécimen	Condiciones de esterilidad
Recomendaciones para transporte	No Procede
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CILINBA
Sinónimos:	Cilindros bacterianos
Código Unificado Andaluz:	BA00022
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	No presencia
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2CC
Conservante	REFRIGERAR
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CILINCE
Sinónimos:	Cilindros celulares
Código Unificado Andaluz:	BA00023
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	No presencia
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2CC
Conservante	REFRIGERAR
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CILINCE
Sinónimos:	Sed. Cilindros céreos
Código Unificado Andaluz:	CLC00136
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	No presencia
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CILINEP
Sinónimos:	Sed. Cilindros epiteliales
Código Unificado Andaluz:	CLC00282
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	No presencia
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CILINER
Sinónimos:	Sed. Cilindros eritrocíticos
Código Unificado Andaluz:	CLC00133
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	No presencia
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CILINGH
Sinónimos:	Sed. Cilindros granulo-hialinos
Código Unificado Andaluz:	CLC00280
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	No presencia
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CILINGR
Sinónimos:	Sed. Cilindros granulados
Código Unificado Andaluz:	CLC00132
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	No presencia
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CILINHI
Sinónimos:	Sed. Cilindros hialinos
Código Unificado Andaluz:	CLC00135
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	No presencia
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CILINLE
Sinónimos:	Sed. Cilindros leucocitarios
Código Unificado Andaluz:	CLC00134
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	No presencia
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CILINLI
Sinónimos:	Cilindros lipídicos
Código Unificado Andaluz:	BA02846
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	No presencia
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2CC
Conservante	REFRIGERAR
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CK
Sinónimos:	CREATINQUINASA
Código Unificado Andaluz:	CLC00543
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	Varón: ? 171 U/L Hembra: ? 145 U/L
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas./NO en petición urgente
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	CIANOKIIT(HIDROXICOBALAMINA) PUEDE CAUSAR INTERFERENCIAS EN
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero (sin hemólisis).Plasma tratado con heparina (Li, NH4+) o con EDTA t
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	40
Unidades convencionales	
Factores de conversión	U/L
Valores de referencia	Diagnóstico y seguimiento del infarto de miocardio, así como de musculopa

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	U/L x 0,0167 = µkat/L
-------------------------	-----------------------

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CL
Sinónimos:	CLORO
Código Unificado Andaluz:	CLC00510
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	101-109 mmol/L
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas./NO en petición urgente
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero.Plasma: tratado con heparina de litio,
Tipo de contenedor	GELOSA, HEPARINA LI
Volumen mínimo	15µ+15µ
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	1,5
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mEq/L
Valores de referencia	De forma similar a los demás iones, los niveles reducidos de cloruro frecue

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CLO
Sinónimos:	CLORO EN ORINA
Código Unificado Andaluz:	CLC00990
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	15µ+15µ
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mEq/L
Valores de referencia	De forma similar a los demás iones, los niveles reducidos de cloruro frecuen

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CLOR
Sinónimos:	CLORO ELIMINADO
Código Unificado Andaluz:	CLC00992
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	40-220 mmol/24H
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA 24h
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	15μ+15μ
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mEq/24H
Valores de referencia	De forma similar a los demás iones, los niveles reducidos de cloruro frecue

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CLOR24
Sinónimos:	CLORO ORINA 24 HORAS
Código Unificado Andaluz:	CLC01228
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	40-220 mmol/24H
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA 24h
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mEq/L
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	COL
Sinónimos:	COLESTEROL TOTAL
Código Unificado Andaluz:	CLC00649
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	200 mg/dL Deseable. 200 – 239 mg/dL En el límite superior. 240 mg/dL Alt
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas.
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero, plasma EDTA O HEPARINA LITIO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	15,2
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	La determinación del colesterol se emplea para cribar el riesgo aterógeno,

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	mmol/L x 38,66 = mg/dL mmol/L x 0,3866 = g/Lmg/dL x 0,0259 = mmol/L
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CONUT
Sinónimos:	EVALUACION ESTADO NUTRICIONAL
Código Unificado Andaluz:	CLC03257
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas.
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero Plasma tratado con heparina de litio y EDTA bipotásico
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	El método de Control Nutricional (CONUT) detecta a los pacientes con ries

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	COR
Sinónimos:	CREATININA ORINA
Código Unificado Andaluz:	CLC00978
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	1ra orina de la mañanaMujeres (28-217 mg/dL)Hombres (39-259 mg/dL)
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	El fármaco cyanokit (hidroxocobalamina) puede causar interferencias con I
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2CC
Conservante	Orina.No emplear aditivos para recoger la orina. Pero si se requiere un con
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	24,5
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	Diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia renal, control de la diálisis rena

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	" $\mu\text{mol/L} \times 0,0113 = \text{mg/dL}$; $\mu\text{mol/L} \times 0,001 = \text{mmol/L}$ "
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	COR
Sinónimos:	CREATININA ELIMINADA
Código Unificado Andaluz:	CLC00980
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	Orina de 24 horas Mujeres (740-1.570 mg/24 h) Hombres (1.040-2.350 mg/24 h)
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	El fármaco cyanokit (hidroxocobalamina) puede causar interferencias con la prueba
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	ALICUOTA DE ORINA BIEN MEZCLADA 2CC.
Conservante	Orina. No emplear aditivos para recoger la orina. Pero si se requiere un conservante
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	ANOTAR DIURESIS EN 24H

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	23
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/24H
Valores de referencia	Diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia renal, control de la diálisis renal

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	" $\mu\text{mol/L} \times 0,0113 = \text{mg/dL}$; $\mu\text{mol/L} \times 0,001 = \text{mmol/L}$ "
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CRHECES
Sinónimos:	Sustancias reductoras (heces)
Código Unificado Andaluz:	CLC20018
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1 día
Volante de petición	Negativo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Heces
Tipo de contenedor	Contenedor boca ancha y tapón rosca
Volumen mínimo	2 gr
Conservante	REFRIGERAR
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	Cualitativo
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CRIBIL
Sinónimos:	Sed. Cristales de bilirrubina
Código Unificado Andaluz:	CLC00153
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	No presencia
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CRICAR
Sinónimos:	Sed. Cristales de carbonato cálcico
Código Unificado Andaluz:	CLC00149
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	No presencia
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CRICIS
Sinónimos:	Sed. Cristales de cistina
Código Unificado Andaluz:	CLC00150
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	No presencia
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CRIOTransferencia
Sinónimos:	Criotransferencia de embriones vitrificados
Código Unificado Andaluz:	RHA70
Disponible para:	Atención especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes a las 12 horas.
Tiempo de respuesta	24 horas-2 semanas.
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	No

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	No
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	Sí (progesterona)
Otras consideraciones	Higiene genital

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Embriones vitrificados
Tipo de contenedor	Placas de transferencia
Volumen mínimo	No Procede
Conservante	Nitrógeno líquido, Medio de vitrificación/desvitrificación
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	No Procede
Observaciones a la toma del espécimen	No Procede
Recomendaciones para transporte	Manipular el embrión en condiciones estériles
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CRISFA
Sinónimos:	Sed. Cristales de fosfato amónico-magnésico
Código Unificado Andaluz:	CLC00147
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	No presencia
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CRISFC
Sinónimos:	Sed. Cristales de fosfato cálcico
Código Unificado Andaluz:	CLC00148
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	No presencia
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CRISLE
Sinónimos:	Sed. Cristales de leucina
Código Unificado Andaluz:	CLC00151
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	No presencia
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CRISOX
Sinónimos:	Sed. Cristales de oxalato cálcico
Código Unificado Andaluz:	CLC00145
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	No presencia
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CRISTIR
Sinónimos:	Sed. Cristales de tirosina
Código Unificado Andaluz:	CLC00152
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	No presencia
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CRISUA
Sinónimos:	Sed. Cristales de uratos amónicos
Código Unificado Andaluz:	CLC00281
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	No presencia
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CRIURI
Sinónimos:	Sed. Cristales de ácido úrico
Código Unificado Andaluz:	CLC00144
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	No presencia
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CROR24
Sinónimos:	Sustancias reductoras (orina 24h)
Código Unificado Andaluz:	BA00334
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1 día
Volante de petición	Negativo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA 24 H
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	REFRIGERAR
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	Cualitativo
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CROR24
Sinónimos:	CREATININA ORINA 24 HORAS
Código Unificado Andaluz:	CLC01223
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	La cefoxitina proporciona resultados de creatinina falsamente aumentados.
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA 24h
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	Diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia renal, control de la diálisis rena

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	CRORINA
Sinónimos:	Sustancias reductoras (orina)
Código Unificado Andaluz:	CLC03287
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1 día
Volante de petición	Negativo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	REFRIGERAR
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	Cualitativo
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	D24
Sinónimos:	DIURESIS DE 24 HORAS
Código Unificado Andaluz:	CLC01104
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA 24h
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	DEP
Sinónimos:	DEPURACION CREATININA
Código Unificado Andaluz:	CLC01106
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO Y ORINA DE 24 HORAS
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	ver creatinina en suero y creatinina en orina 24h
Conservante	REFRIGERAR
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	13,5
Unidades convencionales	
Factores de conversión	ML/MIN
Valores de referencia	Medida del filtrado glomerular

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	DMA 702
Sinónimos:	DENSIDAD, peso específico,SISTEMATICO ORINA
Código Unificado Andaluz:	CLC00117
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	1005-1031
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Orina (primera micción)
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	REFRIGERAR
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	"Valor de 1,020 o mayor indica buen funcionamiento renal. >1,030 en des

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	DMA 702
Sinónimos:	"Densidad (orina; tira color)"
Código Unificado Andaluz:	CLC00117
Disponible para:	Urgencias y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicas	Disponible 24 horas de lunes a domingo
Tiempo de respuesta	1 hora
Volante de petición	1005-1031
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	PRIMERA ORINA DE LA MAÑANA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Orina (primera micción)
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 ml
Conservante	NO
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales
Unidades convencionales
Factores de conversión
Valores de referencia

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	dUri- Metadona
Sinónimos:	Metadona
Código Unificado Andaluz:	601113 - META
Disponible para:	CPD, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24 horas
Volante de petición	NEGATIVO
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	CONSENTIMIENTO INFORMADO

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	CONTENEDOR DE ORINA
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	REFRIGERAR
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	El pH de la orina dentro de los límites de 5 a 8

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	-
Unidades convencionales	
Factores de conversión	ng/mL
Valores de referencia	Seguimiento de pacientes en centros de drogodependencia. Esta prueba

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	dUri- Morfina + analogos
Sinónimos:	Opiáceos
Código Unificado Andaluz:	601273 - OPI
Disponible para:	CPD, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24 horas
Volante de petición	NEGATIVO
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	CONSENTIMIENTO INFORMADO

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	CONTENEDOR DE ORINA
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	REFRIGERAR
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	El pH de la orina dentro de los limites de 5 a 8

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	-
Unidades convencionales	
Factores de conversión	ng/mL
Valores de referencia	Seguimiento de pacientes en centros de drogodependencia.Esta prueba sol

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	ECA
Sinónimos:	ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA
Código Unificado Andaluz:	CLC00585
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas.
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero. Plasma tratado con heparina de litio y EDTA bipotásico.
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	U/L
Valores de referencia	Los niveles de ECA son mas altos en sarcoidosis

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	ELEMCRI
Sinónimos:	Elementos formes (cribaje)
Código Unificado Andaluz:	CLC00283
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	No presencia
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2CC
Conservante	REFRIGERAR
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	EMA 712
Sinónimos:	"Hematíes (orina; tira color)"
Código Unificado Andaluz:	CLC00125
Disponible para:	Urgencias y Atención Especializada
Días/horas de recepción específica	Disponible 24 horas de lunes a domingo
Tiempo de respuesta	1 hora
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	PRIMERA ORINA DE LA MAÑANA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Orina (primera micción)
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 ml
Conservante	NO
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	x 1 / μ L
Valores de referencia	.

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	EMA 712
Sinónimos:	SANGRE EN ORINA
Código Unificado Andaluz:	CLC00125
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	NEGATIVO
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	REFRIGERAR
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	LA TIRA ES MÁS SENSIBLE A LA HEMOGLOBINA Y MIOGLOBINA QUE A LOS ERITROCITOS. LA AUSENCIA TOTAL DE HEMOLISIS PUEDE PROVOCAR UN RESULTADO NEGATIVO A PESAR DE LA PRESENCIA DE

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	Afecciones de los uréteres (uretritis, cálculos), de la vejiga (cistitis, tumore

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	ERITROC
Sinónimos:	Eritrocitos en Orina
Código Unificado Andaluz:	CLC00137
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	No presencia
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2CC
Conservante	REFRIGERAR
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	FA
Sinónimos:	FOSFATASA ALCALINA
Código Unificado Andaluz:	CLC00559
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	Mujeres (18-49 años) 33 - 98 U/L Varones (? 20 años) 43 - 115 U/L
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas./NO en petición urgente
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO O PLASMA (heparina Li)
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	2,8-2,8-5,6 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	24,8
Unidades convencionales	
Factores de conversión	U/L
Valores de referencia	valores elevados en todas las formas de colestasis, enfermedades del esqu

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	U/L x 0,0167 = µkat/L
-------------------------	-----------------------

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	FG
Sinónimos:	FILTRADO GLOMERULAR
Código Unificado Andaluz:	CLC00548
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos:	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas.
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO Y ORINA DE 24 HORAS
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	FIB-4
Sinónimos:	INDICE FIB-4 DE FIBROSIS HEPATICA
Código Unificado Andaluz:	BA02837
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas.
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero Plasma tratado con heparina de litio y EDTA bipotásico
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	FORNS
Sinónimos:	INDICE FORNS
Código Unificado Andaluz:	BA00009
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas.
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero Plasma tratado con heparina de litio y EDTA bipotásico
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	FR
Sinónimos:	FACTOR REUMATOIDE
Código Unificado Andaluz:	CLC00036
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	< 14 IU/mL
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas./NO en petición urgente NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero Plasma tratado con heparina de litio y EDTA bipotásico
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	15 µl
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	24,5
Unidades convencionales	
Factores de conversión	U/ml
Valores de referencia	Criterio diagnóstico para la clasificación de la artritis reumatoidea. Aument

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	FS*
Sinónimos:	NAFLD FIBROSIS SCORE
Código Unificado Andaluz:	BA02840
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas.
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero Plasma tratado con heparina de litio y EDTA bipotásico
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	G
Sinónimos:	GLUCOSA
Código Unificado Andaluz:	CLC00500
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	74-106 mg/dl
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas./NO en petición urgente
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero.Plasma: tratado con heparina de litio, EDTA bipotásico, EDTA con flu
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	6,9
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	Diabetes, insulinoma, el hipopituitarismo o la hipoglucemia inducida por la i

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	mmol/L x 18,02 = mg/dL mmol/L x 0,1802 = g/Lmg/dL x 0,0555 = mmol/L
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	G120
Sinónimos:	GLUCOSA 120 MIN
Código Unificado Andaluz:	CLC00778
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas.
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero Plasma tratado con heparina de litio y EDTA bipotásico
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	G120G
Sinónimos:	GLUCOSA 120 GESTANTES
Código Unificado Andaluz:	BA00012
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas.
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero Plasma tratado con heparina de litio y EDTA bipotásico
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	G180
Sinónimos:	GLUCOSA 180 MIN
Código Unificado Andaluz:	CLC00780
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas.
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero Plasma tratado con heparina de litio y EDTA bipotásico
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	G180G
Sinónimos:	GLUCOSA 180 GESTANTES
Código Unificado Andaluz:	BA00013
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas.
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero Plasma tratado con heparina de litio y EDTA bipotásico
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	G30
Sinónimos:	GLUCOSA 30 MIN
Código Unificado Andaluz:	CLC00772
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas.
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero Plasma tratado con heparina de litio y EDTA bipotásico
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	G60
Sinónimos:	GLUCOSA 60MIN
Código Unificado Andaluz:	CLC00775
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas.
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero Plasma tratado con heparina de litio y EDTA bipotásico
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	G60G
Sinónimos:	GLUCOSA 60 GESTANTES
Código Unificado Andaluz:	BA00011
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas.
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero Plasma tratado con heparina de litio y EDTA bipotásico
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	G90
Sinónimos:	GLUCOSA 90MIN
Código Unificado Andaluz:	CLC00777
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas.
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero Plasma tratado con heparina de litio y EDTA bipotásico
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	GB
Sinónimos:	GLUCOSA BASAL
Código Unificado Andaluz:	CLC00765
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas.
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero Plasma tratado con heparina de litio y EDTA bipotásico
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	GBG
Sinónimos:	GLUCOSA BASAL GESTANTES
Código Unificado Andaluz:	BA00010
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas.
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero Plasma tratado con heparina de litio y EDTA bipotásico
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	GGT
Sinónimos:	?-GLUTAMILTRANSFERASA,GAMMA GLUTAMIL TRASPEPTIDASA
Código Unificado Andaluz:	CLC00540
Disponible para:	AP, AE,
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	Hombres <55 U/L. Mujeres <38 U/L.Niños 1-182 días Varón:12-122 U/L He
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas.
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero, Plasma tratado con heparina de litio y EDTA bipotásico
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	41
Unidades convencionales	
Factores de conversión	U/I
Valores de referencia	Diagnóstico y seguimiento de las enfermedades hepatobiliares, y para dete

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	U/L x 0,0167 = µkat/L
-------------------------	-----------------------

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	GLB
Sinónimos:	GLUCOSA LIQUIDO BIOLOGICO
Código Unificado Andaluz:	CLC20013
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	LCRNiños (60-80 mg/dL) Adultos (40-70 mg/dL) aproximadamente 60 % de
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	LIQUIDO BIOLOGICO
Tipo de contenedor	TUBO VERDE
Volumen mínimo	2CC
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	La determinación de glucosa en el líquido cefalorraquídeo se emplea en la

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	mmol/L x 18,02 = mg/dL mmol/L x 0,1802 = g/L mg/dL x 0,0555 = mmol/L
-------------------------	--

"Glucosa (orina; tira color)"

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	GMA 706
Sinónimos:	"Glucosa (orina; tira color)"
Código Unificado Andaluz:	CLC00120
Disponible para:	Urgencias y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicas	Disponible 24 horas de lunes a domingo
Tiempo de respuesta	1 hora
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	PRIMERA ORINA DE LA MAÑANA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Orina (primera micción)
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 ml
Conservante	NO
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dL
Valores de referencia	Las fluctuaciones observadas en las concentraciones glucémicas de individuo

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	GMA 706
Sinónimos:	GLUCOSA SISTEMATICO ORINA
Código Unificado Andaluz:	CLC00120
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	2-30 mg/dl
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	El acido ascorbico puede dar lugar a falsos negativos. La presenciade sustancias oxidantes (hipoclorito, Cl, o un

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Orina (primera micción)
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	REFRIGERAR
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	La glucosuria se debe casi siempre a hiperglucemia, ya que el umbral de re

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	GO
Sinónimos:	GLUCOSA ORINA
Código Unificado Andaluz:	CLC00971
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	1 – 15 mg/dL
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2CC
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	La glucosuria indica un mal control de la diabetes mellitus o un estado tran

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	mmol/L x 18,02 = mg/dL mmol/L x 0,1802 = g/Lmg/dL x 0,0555 = mmol/L
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	GOR
Sinónimos:	GLUCOSA ELIMINADA EN ORINA
Código Unificado Andaluz:	CLC00973
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	1 – 15 mg/dL
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA 24H
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2CC
Conservante	Antes de recoger la orina de 24 horas, añadir 5 mL de ácido acético glacial
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	ANOTAR DIURESIS 24H

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	6,9
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/24h
Valores de referencia	La glucosuria indica un mal control de la diabetes mellitus o un estado tran

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	$\text{mmol/L} \times 18,02 = \text{mg/dL}$ $\text{mmol/L} \times 0,1802 = \text{g/L}$ $\text{mg/dL} \times 0,0555 = \text{mmol/L}$
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	GOR24
Sinónimos:	GLUCOSA ORINA 24 HORAS
Código Unificado Andaluz:	CLC01219
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	1 – 15 mg/dL
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA 24H
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	La glucosuria indica un mal control de la diabetes mellitus o un estado tran

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	GOT
Sinónimos:	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA, AST
Código Unificado Andaluz:	CLC00541
Disponible para:	Urgencias, Atención primaria y Atención especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	Hombres: hasta 50 U/L, Mujeres: hasta 35 U/L
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas.
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO O PLASMA (heparina Li /EDTA bipotásico), sin hemólisis
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	9 µl
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	17,9
Unidades convencionales	
Factores de conversión	U/L
Valores de referencia	La enzima AST se encuentra en el tejido hepático, cardíaco, muscular y ren

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	U/L x 0,0167 = µkat/L
-------------------------	-----------------------

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	GPT
Sinónimos:	ALANINA AMINO TRANSFERASA, ALT
Código Unificado Andaluz:	CLC00542
Disponible para:	Urgencias, Atención primaria y Atención especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	"Hombres: hasta 50 U/L, Mujeres: hasta 35 U/L; Neonatos/Bebes 13-45 U/L"
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas.
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO O PLASMA (heparina Li /EDTA bipotásico)
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	9 µl
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	U/L
Valores de referencia	Esta elevada en hepatitis, necrosis hepatocelular y colestasis. Muestra mas

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	HBA
Sinónimos:	HEMOGLOBINA GLICOSILADA
Código Unificado Andaluz:	CLC00646
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	3-6%
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas.
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Sangre venosa o capilar anticoagulada o hemolizado.
Tipo de contenedor	EDTA DIPOTASICO
Volumen mínimo	2,5 CC
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	4
Unidades convencionales	
Factores de conversión	%
Valores de referencia	Control de la glucemia de largo plazo, últimos 120 días

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	HDL
Sinónimos:	COLESTEROL HDL
Código Unificado Andaluz:	CLC00650
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	<40 mg/dL Colesterol de las LAD bajo. ? 60 mg/dL Colesterol de las LAD al
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas.
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero, plasma EDTA O HEPARINA LITIO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	19,7
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	La determinación del colesterol HDL en suero es de importancia clínica por

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	mmol/L x 38,66 = mg/dL mmol/L x 0,3866 = g/Lmg/dL x 0,0259 = mmol/L
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	HEMDIS
Sinónimos:	Hematíes dismórficos
Código Unificado Andaluz:	BA00020
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	No presencia
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2CC
Conservante	REFRIGERAR
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	HFS
Sinónimos:	HEPAMET FIBROSIS SCORE
Código Unificado Andaluz:	BA02839
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas.
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero Plasma tratado con heparina de litio y EDTA bipotásico
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	IA
Sinónimos:	IgA
Código Unificado Andaluz:	CLC00549
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	70 – 400 mg/dL
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas.
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero. Plasma: tratado con heparina de litio, EDTA bipotásico,
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	35,9
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	Concentraciones elevadas de IgA policlonal se observan en hepatopatías cr

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	$\text{mg/dL} \times 0,01 = \text{g/L}$ $\text{g/L} \times 6,25 = \mu\text{mol/L}$ $\text{g/L} \times 100 = \text{mg/dL}$ $\mu\text{mol/L} \times 0,16 = \text{g/L}$
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	IG
Sinónimos:	INMUNOGLOBULINA G
Código Unificado Andaluz:	CLC00055
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específica	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	Adultos 700-1600 mg/dL
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero. Plasma: tratado con heparina de litio, EDTA bipotásico,
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	9µ+20µ
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	16,5
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	Niveles elevados de IgG policlonal se observan en el lupus eritematoso dis

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	mg/dL x 0,01 = g/L g/L x 6,67 = µmol/L g/L x 100 = mg/dL µmol/L x 0,15 = g/L mg/L x 6,67 = nmol/L nmol/L x 0,15 = mg/L
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	IGE
Sinónimos:	INMUNOGLOBULINA E
Código Unificado Andaluz:	CLC00041
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	0-99 UI/ml
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero Plasma tratado con heparina de litio y EDTA bipotásico
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	IGGLCR 976
Sinónimos:	IgG LIQUIDO BIOLOGICO LCR
Código Unificado Andaluz:	CLC20101
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	10-30 mg/L
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	LCR
Tipo de contenedor	Tubo 10 mL tapón verde
Volumen mínimo	1 ml
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	En mano (no en tubo neumático)
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	La determinación de IgG en el líquido cefalorraquídeo (LCR) se emplea par

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	$\text{mmol/L} \times 18,02 = \text{mg/dL}$ $\text{mmol/L} \times 0,1802 = \text{g/L}$ $\text{mg/dL} \times 0,0555 = \text{mmol/L}$
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	IgLB 960
Sinónimos:	IgG LIQUIDO BIOLOGICO
Código Unificado Andaluz:	BA00650
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	LIQUIDO BIOLOGICO
Tipo de contenedor	Tubo 10 mL tapón verde
Volumen mínimo	1 ml
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	En mano (no en tubo neumático)
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	mmol/L x 18,02 = mg/dL mmol/L x 0,1802 = g/Lmg/dL x 0,0555 = mmol/L
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	IH
Sinónimos:	INDICE HEMOLITICO
Código Unificado Andaluz:	B00054
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero Plasma tratado con heparina de litio y EDTA bipotásico
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	II
Sinónimos:	INDICE ICTERICO
Código Unificado Andaluz:	B00056
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero Plasma tratado con heparina de litio y EDTA bipotásico
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	IL
Sinónimos:	INDICE LIPEMICO
Código Unificado Andaluz:	B00055
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero Plasma tratado con heparina de litio y EDTA bipotásico
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	IM
Sinónimos:	INMUNOGLOBULINA M
Código Unificado Andaluz:	CLC00551
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	Adultos 40-230 mg/dL Niños 20-200 mg/dL
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero. Plasma tratado con heparina de litio y EDTA bipotásico.
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	9+20µl (normal+ aumentado)
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	47,3
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	Es el primer anticuerpo específico que aparece en suero con una infección.

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	$\text{mg/dL} \times 0,01 = \text{g/L}$ $\text{g/L} \times 1,03 = \mu\text{mol/L}$ $\text{g/L} \times 100 = \text{mg/dL}$ $\mu\text{mol/L} \times 0,971 = \text{g/L}$
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	IRI
Sinónimos:	INDICE DE RESISTENCIA A LA INSULINA
Código Unificado Andaluz:	CLC01737
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas.
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero Plasma tratado con heparina de litio y EDTA bipotásico
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	K
Sinónimos:	POTASIO
Código Unificado Andaluz:	CLC00508
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	Suero 3,5-5,1 mmol/L. Plasma 3,4 – 4,5 mmol/L
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas./NO en petición urgente
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero.Plasma: tratado con heparina de litio,
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	15µ+15µ
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	5,6
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mEq/l
Valores de referencia	La concentración reducida de potasio puede deberse a una dieta que no co

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	K/L
Sinónimos:	CADENAS KAPPA LIBRES/CADENAS LAMBDA LIBRES EN SUERO
Código Unificado Andaluz:	CLC01092
Disponible para:	Atención primaria y Atención especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	0,26-1,65
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas.
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero.Plasma: tratado con heparina de litio, EDTA bipotásico.
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	KAPPA
Sinónimos:	CADENAS LIGERAS KAPPA
Código Unificado Andaluz:	CLC01090
Disponible para:	Atención primaria y Atención especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	33-194 mg/dl
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas.
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero. Plasma: tratado con heparina de litio, EDTA bipotásico.
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	N?? (9-3-18)µl
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	Ayuda para el diagnóstico de afecciones tales como el mieloma múltiple, lo

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	mg/dL x 0,01 = g/L g/L x 100 = mg/dL
-------------------------	--------------------------------------

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	KO
Sinónimos:	POTASIO EN ORINA
Código Unificado Andaluz:	CLC00987
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	25-125 mEq/24h
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	15µ+15µ
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	23,2
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mEq/l
Valores de referencia	La excreción depende de la ingesta y está controlada por los mismos factores

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	KOR
Sinónimos:	POTASIO ELIMINADO
Código Unificado Andaluz:	CLC00989
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	25-125 mEq/24h
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA 24H
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	15μ+15μ
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	22,2
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mEq/24H
Valores de referencia	La excreción depende de la ingesta y está controlada por los mismos factores

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	KOR24
Sinónimos:	POTASIO ORINA 24 HORAS
Código Unificado Andaluz:	CLC01227
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	25-125 mEq/24h
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA 24H
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mEq/l
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	LAMBDA
Sinónimos:	CADENAS LIGERAS LAMBDA
Código Unificado Andaluz:	CLC01091
Disponible para:	Atención primaria y Atención especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	57,1-263 mg/dl
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas.
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero.Plasma: tratado con heparina de litio, EDTA bipotásico.
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	(Normal 9 µL Disminuido 3 µL Aumentado 20 µL) *2
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	Util en el diagnóstico de afecciones tales como el mieloma múltiple, los neo

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	LDH
Sinónimos:	LACTATO DESHIDROGENASA
Código Unificado Andaluz:	CLC00525
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	208 - 378 U/L
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas./NO en petición urgente
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero.Plasma: tratado con heparina de litio,
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	LIBRE DE HEMOLISIS

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	14,7
Unidades convencionales	
Factores de conversión	U/L
Valores de referencia	Niveles elevados de LDH sérica acompañan diversos cuadros patológicos. L

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	U/L x 0,0167 = µkat/L
-------------------------	-----------------------

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	LDL
Sinónimos:	COLESTEROL LDL
Código Unificado Andaluz:	CLC00651
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	<100 mg/dL Optimo 100 – 129 mg/dL Casi / Por encima del óptimo 130 –
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas.
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	suero, plasma EDTA O HEPARINA LITIO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	24,4
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	La determinación del LDL colesterol se emplea para cribar el riesgo ateróg

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	mmol/L x 38,66 = mg/dL mmol/L x 0,3866 = g/Lmg/dL x 0,0259 = mmol/L
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	LDL*
Sinónimos:	COLESTEROL LDL CALCULADO
Código Unificado Andaluz:	CLC00470
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	<100 mg/dL Optimo 100 – 129 mg/dL Casi / Por encima del óptimo 130 –
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas.
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	suero, plasma EDTA O HEPARINA LITIO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	La determinación del LDL colesterol se emplea para cribar el riesgo ateróg

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	LEUAGR
Sinónimos:	Sed. Leucocitos (agregados)
Código Unificado Andaluz:	CLC00450
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	No presencia
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	LEUCOO
Sinónimos:	Leucocitos (orina)
Código Unificado Andaluz:	CLC00138
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	No presencia
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2CC
Conservante	REFRIGERAR
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	LIPA
Sinónimos:	LIPASA
Código Unificado Andaluz:	CLC00553
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	Suero/plasma Hombres/mujeres 13-60 U/L
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas./NO en petición urgente
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO O PLASMA (heparina Li)
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	2 µl
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	28,3
Unidades convencionales	
Factores de conversión	U/L
Valores de referencia	En la pancreatitis aguda, la actividad de la lipasa aumenta en el plazo de 4

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	U/L x 0,0167 = µkat/L
-------------------------	-----------------------

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	LIPIDOR
Sinónimos:	Lípidos en orina
Código Unificado Andaluz:	BA00021
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	No presencia
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2CC
Conservante	REFRIGERAR
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	LMA 716
Sinónimos:	"Leucocitos (orina; tira color)"
Código Unificado Andaluz:	CLC00124
Disponible para:	Urgencias y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicas	Disponible 24 horas de lunes a domingo
Tiempo de respuesta	1 hora
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	PRIMERA ORINA DE LA MAÑANA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	orina
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo,
Volumen mínimo	2 ml
Conservante	NO
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	LMA 716
Sinónimos:	LEUCOCITOS EN ORINA, TIRA
Código Unificado Andaluz:	CLC00124
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	NEGATIVO
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	EL FORMALDEIDO O LA BILIRRUBINA PUEDEN DAR FALSOS POSITIVOS.GLUCOSA >500MG/DL,

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	REFRIGERAR
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	Inflamación e infección del tracto urinario

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	MAU
Sinónimos:	ALBUMINA, MICROALBUMINURIA
Código Unificado Andaluz:	CLC01017
Disponible para:	Atención primaria y Atención especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2μ
Conservante	REFIGERAR ORINA
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	albumina primera micción 55
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dL
Valores de referencia	La excreción baja pero anormal de albúmina es denominada microalbumin

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	$\text{g/L} \times 100 = \text{mg/dL}$ $\text{g/L} \times 15,2 = \mu\text{mol/L}$ $\text{mg/L} \times 0,1 = \text{mg/dL}$ $\text{mg/L} \times 0,0152 = \mu\text{mol/L}$
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	MG
Sinónimos:	MAGNESIO
Código Unificado Andaluz:	CLC00595
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específica	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	Hombres 1,8 – 2,6 mg/dL Mujeres 1,9 – 2,5 mg/dL
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas.
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	La levodopa y el intralipid (2.000 mg/L) provocan valores de magnesio falsos
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero.Plasma: tratado con heparina de litio
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de litio
Volumen mínimo	2µL
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	6,4
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	Incrementos en las concentraciones séricas de magnesio se registran en la

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	mmol/L x 2,43 = mg/dL mg/dL x 0,411 = mmol/L mval/L x 0,5 = mmol/L mval/L x 1,22 = mg/dL mval/L = mEq/L
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	MGO
Sinónimos:	MAGNESIO EN ORINA
Código Unificado Andaluz:	CLC01008
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	4,10-13,8 mg/dl
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	La levodopa y el intralipid (2.000 mg/L) provocan valores de magnesio falsos
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	4 µL
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	37,4
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	El magnesio urinario representa alrededor de la tercera parte de la ingesta

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	$\text{mmol/L} \times 2,43 = \text{mg/dL}$ $\text{mg/dL} \times 0,411 = \text{mmol/L}$ $\text{mval/L} \times 0,5 = \text{mmol/L}$ $\text{mval/L} \times 1,22 = \text{mg/dL}$ $\text{mval/L} = \text{mEq/L}$
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	MGOR
Sinónimos:	MAGNESIO ELIMINADO
Código Unificado Andaluz:	CLC01009
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	73 – 122 mg/24 h)
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	La levodopa y el intralipid (2.000 mg/L) provocan valores de magnesio falsos
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA 24H
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	4 µL
Conservante	Acidulada con 6M HCl
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	37,6
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/24H
Valores de referencia	Incrementos en las concentraciones séricas de magnesio se registran en la

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	mmol/L x 2,43 = mg/dL mg/dL x 0,411 = mmol/L mval/L x 0,5 = mmol/L mval/L x 1,22 = mg/dL
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	MGOR24
Sinónimos:	MAGNESIO ORINA 24 HORAS
Código Unificado Andaluz:	CLC01232
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	73 – 122 mg/24 h)
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	La levodopa y el intralipid (2.000 mg/L) provocan valores de magnesio falsos
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA 24H
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	NA
Sinónimos:	SODIO
Código Unificado Andaluz:	CLC00506
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	136-146 mmol/L
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas./NO en petición urgente
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero.Plasma: tratado con heparina de litio,
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	15µ+15µ
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	1
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mEq/L
Valores de referencia	La concentración de sodio se reduce, entre otras causas, debido a vómitos

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	NAO
Sinónimos:	SODIO EN ORINA
Código Unificado Andaluz:	CLC00984
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	40-220 mmol/24h
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	15µ+15µ
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	26,8
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mEq/L
Valores de referencia	Tiene gran interés su determinación para diferenciar situaciones de insufici

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	NAOR
Sinónimos:	SODIO ELIMINADO
Código Unificado Andaluz:	CLC00986
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	40-220 mmol/24h
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA 24 H
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	15μ+15μ
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	16,7
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mEq/24H
Valores de referencia	Tiene gran interés su determinación para diferenciar situaciones de insufici

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	NAOR24
Sinónimos:	SODIO ORINA 24 HORAS
Código Unificado Andaluz:	CLC01226
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	40-220 mmol/24h
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas.
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA 24 H
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mEq/L
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	NDB
Sinónimos:	NUMERO DE DIBUCAINA
Código Unificado Andaluz:	CLC00556
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	70-100
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas./NO en petición urgente
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	suero, plasma EDTA, LIBRES DE HEMOLISIS
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	%
Valores de referencia	Se emplea para ver la respuesta del paciente a la SC succinilcolina. Esto se

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	NEX
Sinónimos:	NITROGENO EXCRETADO
Código Unificado Andaluz:	BA00005
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	NITROGENO UREICO (ver urea)
Sinónimos:	BUN
Código Unificado Andaluz:	BA20273
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI/NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero. Plasma tratado con heparina de litio.
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	2 µl
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	NMA 718
Sinónimos:	"Nitritos (orina; tira color)"
Código Unificado Andaluz:	CLC00126
Disponible para:	Urgencias y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicas	Disponible 24 horas de lunes a domingo
Tiempo de respuesta	1 hora
Volante de petición	NEGATIVO
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	PRIMERA ORINA DE LA MAÑANA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Orina
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo,
Volumen mínimo	2 ml
Conservante	NO
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales
Unidades convencionales
Factores de conversión
Valores de referencia

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	NMA 718
Sinónimos:	NITRITOS EN ORINA
Código Unificado Andaluz:	CLC00126
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	NEGATIVO
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	REFRIGERAR
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	Infección o colonización bacteriana del tracto urinario, alta especificidad, n

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	O
Sinónimos:	OSMOLALIDAD
Código Unificado Andaluz:	CLC00520
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas.
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero. Plasma tratado con heparina de litio.
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	OC
Sinónimos:	OSMOLALIDAD CALCULADA
Código Unificado Andaluz:	CLC03627
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas.
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero. Plasma tratado con heparina de litio.
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	OO
Sinónimos:	OSMOLALIDAD ORINA
Código Unificado Andaluz:	CLC01000
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	OOC
Sinónimos:	OSMOLALIDAD ORINA CALCULADA
Código Unificado Andaluz:	CLC03554
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	OTROS
Sinónimos:	Otros
Código Unificado Andaluz:	BA00019
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	no
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2CC
Conservante	REFRIGERAR
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	P
Sinónimos:	FOSFORO, FOSFATO
Código Unificado Andaluz:	CLC00519
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	Adultos 2,5 – 4,5 mg/dL Niños 4,0 – 7,0 mg/dL
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas./NO en petición urgente
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero Plasma tratado con heparina de litio
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	2,5 µl
Conservante	2º a 10 °C
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	9,4
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	El aumento de la concentración de fósforo provoca una disminución del niv

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	mmol/L x 3,10 = mg/dL mmol/L x 31 = mg/L mg/L x 0,0323 = mmol/L
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	PCR
Sinónimos:	PROTEINA C REACTIVA
Código Unificado Andaluz:	CLC00636
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	< 0,5 mg/dl
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas./NO en petición urgente NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero. Plasma tratado con heparina de litio, EDTA bi- o tripotásico.
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	2 µl
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	76,3
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	Se emplea para reconocer procesos inflamatorios sistémicos, para evaluar

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	mg/L x 9,52 = nmol/L mg/dL x 95,2 = nmol/L mg/L x 0,1 = mg/dL mg/dL x 10 = mg/L mg/dL x 0,01 = g/L g/L x 100 = mg/Dl
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	PHHECES
Sinónimos:	PH (Heces)
Código Unificado Andaluz:	CLC20017
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	1 día
Volante de petición	06-ago
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Heces
Tipo de contenedor	Contenedor boca ancha y tapón rosca
Volumen mínimo	2 gr
Conservante	REFRIGERAR
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	PHMA 700
Sinónimos:	Ph,SISTEMATICO ORINA
Código Unificado Andaluz:	CLC00118
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	05-ago
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	REFRIGERAR
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	ph acido: dieta proteica, ayuno prolongado, deshidratación, diarrea, acidosis

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	PHMA 700
Sinónimos:	"pH (orina; tira color)"
Código Unificado Andaluz:	CLC00118
Disponible para:	Urgencias y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicas	Disponible 24 horas de lunes a domingo
Tiempo de respuesta	1 hora
Volante de petición	05-ago
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	PRIMERA ORINA DE LA MAÑANA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	orina
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo,
Volumen mínimo	2 ml
Conservante	NO
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Plm- Corticotropina
Sinónimos:	ACTH
Código Unificado Andaluz:	CLC11928
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	5-60 pg/mL (1,10-13,21 pmol/L)
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Ninguna

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	PLASMA (EDTA)
Tipo de contenedor	Tubo frío con EDTA, tapón morado
Volumen mínimo	50 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Separe el plasma en una centrifugadora refrigerada. Determine las muestras inmediatamente o congélelas a -20°C.

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	pg/mL
Factores de conversión	pmol/L
Valores de referencia	TTrastornos del eje HT-HF-suprarrenal

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	"pg/mL x 0,2202 = pmol/L; pmol/L x 4,541 = pg/mL"
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Plm-ACTH (20:00H)
Sinónimos:	Corticotropina (20h)
Código Unificado Andaluz:	B00950
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	5-60 pg/mL (1,10-13,21 pmol/L)
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Ninguna

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	PLASMA (EDTA)
Tipo de contenedor	Tubo frío con EDTA, tapón morado
Volumen mínimo	50 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Separe el plasma en una centrifugadora refrigerada. Determine las muestras inmediatamente o congélelas a -20°C.

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	pg/mL
Factores de conversión	pmol/L
Valores de referencia	Trastornos del eje HT-HF-suprarrenal

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	"pg/mL x 0,2202 = pmol/L; pmol/L x 4,541 = pg/mL"
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	PMA 704
Sinónimos:	"Proteínas (orina; tira color)"
Código Unificado Andaluz:	CLC00119
Disponible para:	Urgencias y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Disponible 24 horas de lunes a domingo
Tiempo de respuesta	8 horas
Volante de petición	Negativo < 25 mg/dl
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Orina
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo,
Volumen mínimo	2 ml
Conservante	NO
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dL
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	PMA 704
Sinónimos:	PROTEINA SISTEMATICO ORINA
Código Unificado Andaluz:	CLC00119
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	Negativo < 25 mg/dl
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	REFRIGERAR
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	Glomerulonefritis, pielonefritis, riñón cístico, infección de las vías urinarias

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	PO
Sinónimos:	FOSFORO, FOSFATO ORINA
Código Unificado Andaluz:	CLC00997
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	400-1300 mg/24h
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2,5 µl
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	26,5
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	La fosfaturia (fosfatos bicálcico y, tricálcico y amónico-magnésico) depende

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	mmol/L x 3,10 = mg/dL mmol/L x 31 = mg/L mg/L x 0,0323 = mmol/L
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	PO/CR
Sinónimos:	FOSFORO/CREATININA ORINA
Código Unificado Andaluz:	CLC00998
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg de fosforo/ g de creatinina
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	POR
Sinónimos:	FOSFORO, FOSFATO ELIMINADO
Código Unificado Andaluz:	CLC00999
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	400-1300 mg/24h
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA 24 H
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2,5 µl
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	22,6
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/24H
Valores de referencia	La fosfaturia (fosfatos bicálcico y, tricálcico y amónico-magnésico) depende

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	mmol/L x 3,10 = mg/dL mmol/L x 31 = mg/L mg/L x 0,0323 = mmol/L
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	POR24
Sinónimos:	FOSFORO ORINA 24 HORAS
Código Unificado Andaluz:	CLC01231
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	400-1300 mg/24h
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA 24 H
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	La fosfatúria (fosfatos bicálcico y, tricálcico y amónico-magnésico) depende

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	PREALB
Sinónimos:	PREALBUMINA
Código Unificado Andaluz:	CLC00629
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	20-40 mg/dl
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas.
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero. Plasma tratado con heparina de litio.
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	15 µl
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	19,1
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	Al tener una vida media de aprox. 2 días, su concentración sérica disminuye

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	$\text{mg/dL} \times 0,01 = \text{g/L}$ $\text{g/L} \times 100 = \text{mg/dL}$ $\text{g/L} \times 18,2 = \mu\text{mol/L}$ $\text{mg/dL} \times 0,182 = \mu\text{mol/L}$
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	PRECFOF
Sinónimos:	Sed. Precipitado de fosfatos amorfos
Código Unificado Andaluz:	CLC00146
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	No presencia
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	PRECURA
Sinónimos:	Sed. Precipitado de uratos amorfos
Código Unificado Andaluz:	CLC00143
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	No presencia
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	PT
Sinónimos:	PROTEINAS TOTALES
Código Unificado Andaluz:	CLC00607
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	Adultos 6,6 – 8,3 g/dL Niños (1 - 18 a) 5,7 – 8,0 g/dL Recién nacidos (1 - 3
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas./NO en petición urgente NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero.Plasma: tratado con heparina de litio, EDTA bipotásico,
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	6 µl
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	4
Unidades convencionales	
Factores de conversión	g/dl
Valores de referencia	Diagnóstico y tratamiento de una variedad de enfermedades hepáticas, ren

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	g/L x 0,1 = g/dl
-------------------------	------------------

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	PTLB 952
Sinónimos:	PROTEINAS LIQUIDO BIOLOGICO
Código Unificado Andaluz:	LB007
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	LIQUIDO BIOLOGICO
Tipo de contenedor	TUBO VERDE
Volumen mínimo	2 µl
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	g/dl
Valores de referencia	Diferenciación exudado y transudado. Ejemplo proteínas líquido pleural / pl

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	mg/L x 0,1 = mg/dLmg/L x 0,001 = g/L
------------------	--------------------------------------

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	PTLCR 970
Sinónimos:	PROTEINAS LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Código Unificado Andaluz:	CLC20097
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	0,15-0,45 g/l
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Tipo de contenedor	TUBO VERDE
Volumen mínimo	2 µl
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	g/l
Valores de referencia	Valoración de la alteracion de la permeabilidad barrera hematoencefalica y

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	mg/L x 0,1 = mg/dLmg/L x 0,001 = g/L
-------------------------	--------------------------------------

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	PTLCR 970
Sinónimos:	Proteínas totales (LCR)
Código Unificado Andaluz:	CLC20097
Disponible para:	Urgencias y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Disponible 24 horas de lunes a domingo
Tiempo de respuesta	8 horas
Volante de petición	0,15-0,45
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	LCR
Tipo de contenedor	Tubo 10 mL tapón verde
Volumen mínimo	200 ul
Conservante	NO
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	En mano (no en tubo neumático)
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	g/L
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	PTO
Sinónimos:	PROTEINAS ORINA
Código Unificado Andaluz:	CLC01014
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	< 150 mg/L
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 µl
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	17,8
Unidades convencionales	
Factores de conversión	g/l
Valores de referencia	Diagnóstico y el tratamiento de enfermedades caracterizadas por proteinur

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	mg/L x 0,1 = mg/dLmg/L x 0,001 = g/L
-------------------------	--------------------------------------

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	PTO/CR
Sinónimos:	PROTEINA/CREATININA ORINA
Código Unificado Andaluz:	CLC01015
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg de proteína/ g de creatinina
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	PTO24
Sinónimos:	PROTEINAS ORINA 24 HORAS
Código Unificado Andaluz:	CLC01221
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA 24 H
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	g/l
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	PTOR
Sinónimos:	PROTEINAS ELIMINADAS EN ORINA
Código Unificado Andaluz:	CLC01016
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	inferior a 24 horas
Volante de petición	24 h: < 140 mg/24 h
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA 24 H
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 µl
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	Desechar 1ª orina de la mañana , recoger orina de 24 h incluyendo la 1ª de día siguiente
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	23,7
Unidades convencionales	
Factores de conversión	g/24H
Valores de referencia	Diagnóstico y el tratamiento de enfermedades caracterizadas por proteinur

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	mg/L x 0,1 = mg/dLmg/L x 0,001 = g/L
-------------------------	--------------------------------------

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	SEDESP
Sinónimos:	Sed. Espermatozoides
Código Unificado Andaluz:	CLC00142
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	No presencia
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	SEDLEV
Sinónimos:	Sed. Levaduras
Código Unificado Andaluz:	CLC00452
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	No presencia
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	SEDMUC
Sinónimos:	Sed. Mucosidad
Código Unificado Andaluz:	CLC00141
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	No presencia
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	SEDTRIC
Sinónimos:	Sed. Trichomonas vaginalis
Código Unificado Andaluz:	CLC00140
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	No presencia
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Seminograma (criopreservación seminal)
Sinónimos:	Criopreservación semen
Código Unificado Andaluz:	CLC20226
Disponible para:	Atención especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 9:00-10:00 horas.
Tiempo de respuesta	8-24 horas.
Volante de petición	>5 espermatozoides móviles/campo en semen fresco
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	No

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	No
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	No
Otras consideraciones	Higiene genital

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Semen
Tipo de contenedor	Contenedor estéril de boca ancha
Volumen mínimo	1,5 mL
Conservante	Agente Crioprotector
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	No Procede
Observaciones a la toma del espécimen	"Abstinencia sexual 2-4 días; recoger la totalidad de la muestra directamente en el envase "
Recomendaciones para transporte	Envolver envase con papel aluminio y entregar antes de transcurrir 45min
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	Millones de espermatozoides/mL de semen
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Seminograma (FISH)
Sinónimos:	FISH en espermatozoides
Código Unificado Andaluz:	CLC20226
Disponible para:	Atención especializada
Días/horas de recepción específica	Lunes a viernes de 9:00-10:00 horas.
Tiempo de respuesta	3 semanas.
Volante de petición	>5 millones espermatozoides/mL de semen
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	No

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	No
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	No
Otras consideraciones	Higiene genital

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Semen
Tipo de contenedor	Contenedor estéril de boca ancha, Tubo cónico estéril de 12mL
Volumen mínimo	1 mL
Conservante	No Procede
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	No Procede
Observaciones a la toma del espécimen	"Abstinencia sexual 2-4 días; recoger la totalidad de la muestra directamente en el envase "
Recomendaciones para transporte	Envolver envase con papel aluminio y entregar antes de transcurrir 45min
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	Millones de espermatozoides/mL de semen
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Seminograma (liq. seminal)
Sinónimos:	Seminograma/Espermiograma
Código Unificado Andaluz:	CLC20226
Disponible para:	Atención primaria y Atención especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 9:00-10:00 horas.
Tiempo de respuesta	8-24 horas.
Volante de petición	Los descritos por la OMS 2021
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	No

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	No
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	No
Otras consideraciones	Higiene genital

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Semen
Tipo de contenedor	Contenedor estéril de boca ancha
Volumen mínimo	1,5 mL
Conservante	No procede
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	No Procede
Observaciones a la toma del espécimen	"Abstinencia sexual 2-4 días; recoger la totalidad de la muestra directamente en el envase "
Recomendaciones para transporte	Envolver envase con papel aluminio y entregar antes de transcurrir 45min
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	Millones de espermatozoides/mL de semen
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Seminograma en orina
Sinónimos:	Estudio eyaculación retrógrada
Código Unificado Andaluz:	CLC20226
Disponible para:	Atención especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 9:00-10:00 horas.
Tiempo de respuesta	8 horas.
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	No

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	No
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	No
Otras consideraciones	Higiene genital

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Orina
Tipo de contenedor	Contenedor estéril de boca ancha
Volumen mínimo	10 mL
Conservante	No Procede
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	No Procede
Observaciones a la toma del espécimen	Ingerir bicarbonato sódico el día previo al análisis
Recomendaciones para transporte	Envolver envase con papel aluminio y entregar antes de transcurrir 45min
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Seminograma Post-vasectomía (líq. seminal)
Sinónimos:	Estudio postvasectomía
Código Unificado Andaluz:	CLC20280
Disponible para:	Atención primaria y Atención especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 9:00-10:00 horas.
Tiempo de respuesta	8 horas.
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	No

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	No
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	No
Otras consideraciones	Higiene genital

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Semen
Tipo de contenedor	Contenedor estéril de boca ancha
Volumen mínimo	1 mL
Conservante	No Procede
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	No Procede
Observaciones a la toma del espécimen	"Abstinencia sexual 2-4 días; recoger la totalidad de la muestra directamente en el envase "
Recomendaciones para transporte	Envolver envase con papel aluminio y entregar antes de transcurrir 45min
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	Nº Espermatozoides/Campo
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Sm- Proteína Plasmática A asociada al embarazo
Sinónimos:	PAPP-A
Código Unificado Andaluz:	CLC00546
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	12-24 horas
Volante de petición	Semanas de gestación
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	9 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	-
Unidades convencionales	mUI/mL, UI/L
Factores de conversión	mUI/mL
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	mUI/mL x 1000 = mUI/L, mUI/mL x 1 = UI/L, UI/L x 1000 = mUI/L
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	SMA720
Sinónimos:	SEDIMENTO
Código Unificado Andaluz:	CLC00109
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	Patológica la presencia de mas de 5 hematíes o leucocitos/Campo(x400),
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	10 CC
Conservante	REFRIGERAR
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	"Glomerulonefritis, daño tubular renal, ITU, parasitosis, neoplasias, litiasis

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	SMA720
Sinónimos:	Sedimento urinario
Código Unificado Andaluz:	CLC00109
Disponible para:	Urgencias y Atencion Especializada
Días/horas de recepción específicos	Disponible 24 horas de lunes a domingo
Tiempo de respuesta	Disponible 24 horas de lunes a domingo
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	orina
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo,
Volumen mínimo	2 ml
Conservante	NO
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	SOH
Sinónimos:	Sangre oculta
Código Unificado Andaluz:	CLC00272
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	1 día
Volante de petición	Negativo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Heces
Tipo de contenedor	Tubo colector con buffer específico para esta prueba
Volumen mínimo	
Conservante	REFRIGERAR
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	Cualitativo
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	SOH1
Sinónimos:	"Sangre oculta (muestra 1; inm.)"
Código Unificado Andaluz:	CLC00276
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	1 día
Volante de petición	Negativo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Heces
Tipo de contenedor	Tubo colector con buffer específico para esta prueba
Volumen mínimo	
Conservante	REFRIGERAR
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	Cualitativo
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	SOH2
Sinónimos:	"Sangre oculta (muestra 2; inm.)"
Código Unificado Andaluz:	CLC00277
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	1 día
Volante de petición	Negativo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Heces
Tipo de contenedor	Tubo colector con buffer específico para esta prueba
Volumen mínimo	
Conservante	REFRIGERAR
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	Cualitativo
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	SOH3
Sinónimos:	"Sangre oculta (muestra 3; inm.)"
Código Unificado Andaluz:	CLC00278
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	1 día
Volante de petición	Negativo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Heces
Tipo de contenedor	Tubo colector con buffer específico para esta prueba
Volumen mínimo	
Conservante	REFRIGERAR
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	Cualitativo
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm - Eritropoyetina
Sinónimos:	EPO
Código Unificado Andaluz:	CLC00466
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	12-24 horas
Volante de petición	2,59-18,5 mUI/mL
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Ninguna

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	50 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mUI/mL
Valores de referencia	Estudio de anemias y policitemias

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm - PIGF
Sinónimos:	Factor de crecimiento placentario (PIGF-1)
Código Unificado Andaluz:	CLC04062
Disponible para:	Atención especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	12-24 horas
Volante de petición	Semanas de gestación
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Ninguna

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	50 µl
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	pg/mL
Valores de referencia	Marcador de la Preeclampsia gestacional

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm - Riesgo de trisomía 21
Sinónimos:	Cribado bioquímico del 2º trimestre
Código Unificado Andaluz:	CLC01665
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	
Tiempo de respuesta	
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	
Dieta previa a la prueba	
Supresión de fármacos anterior a la prueba	
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	
Tipo de contenedor	
Volumen mínimo	
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm - sFLT-1
Sinónimos:	Factor de crecimiento endotelial vascular, receptor 1 soluble (sFLT-1)
Código Unificado Andaluz:	CLC04105
Disponible para:	Atención especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	12-24 horas
Volante de petición	Semanas de gestación
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Ninguna

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	20 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	pg/mL
Valores de referencia	Marcador de la Preeclampsia gestacional

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm - Transferrina (índice de saturación)
Sinónimos:	Transferrina (índice de saturación)
Código Unificado Andaluz:	CLC00591
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	12-24 horas
Volante de petición	17,1-30,6
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	100 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	x 1
Factores de conversión	%
Valores de referencia	Estudio de anemias

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm - Transferrina (receptor soluble)
Sinónimos:	Transferrina (receptor soluble)
Código Unificado Andaluz:	CLC00461
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	12-24 horas
Volante de petición	0,8-2,3 mg/dL
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	100 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	nmol/L
Factores de conversión	mg/L
Valores de referencia	Estudio de anemias

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	nmol/L x 0,0738 = mg/L
-------------------------	------------------------

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- ?HCG libre
Sinónimos:	Coriogonadotropina, subunidad beta (libre)
Código Unificado Andaluz:	CLC11926
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	12-24 horas
Volante de petición	Semana de gestación
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Ninguna

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	6 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	-
Unidades convencionales	UI/L, mUI/mL
Factores de conversión	ng/mL
Valores de referencia	Evaluación del riesgo de aneuploidías en el embarazo

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	UI/L x 1 = mUI/mL, UI/L x 1 = ng/mL, mUI/mL x 1 = ng/mL
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- 17- Hidroxiprogesterona (60 min)
Sinónimos:	17- Hidroxiprogesterona (60 min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 12044
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	72-96 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Ninguna

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador otubo con heparina de li
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/mL
Factores de conversión	nmol/L
Valores de referencia	Diagnóstico y seguimiento de la deficiencia enzimática responsable de la hi

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- 17-Hidroxiprogesterona (90 min)
Sinónimos:	17- Hidroxiprogesterona (90 min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 00476
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	72-96 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Ninguna

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador otubo con heparina de li
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/mL
Factores de conversión	nmol/L
Valores de referencia	Diagnóstico y seguimiento de la deficiencia enzimática responsable de la hi

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- a-Fetoproteina
Sinónimos:	Alfa-Fetoproteína (prenatal)
Código Unificado Andaluz:	CLC02556
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	12-24 horas
Volante de petición	2,72?1210 ng/mL
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	6 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	46
Unidades convencionales	UI/mL
Factores de conversión	ng/mL
Valores de referencia	Cribado prenatal de aneuploidías en el 2º trimestre

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	UI/mL x 1.21 = ng/mL ng/mL x 0.83 = UI/mL
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Aldosterona
Sinónimos:	Aldosterona
Código Unificado Andaluz:	CLC12131
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	7 días
Volante de petición	Posición Ortostática: 2,52-39,2ng/mL // Posición Supina: 1,76-23,2ng/mL
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Se determina semanalmente cuando se tiene una cantidad suficiente de muestras.

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	PLASMA (EDTA)
Tipo de contenedor	Tubo frío con EDTA, tapón morado
Volumen mínimo	20 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Separe el plasma en una centrifugadora refrigerada.Determine las muestras inmediatamente o congélelas a -20°C.

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/mL
Factores de conversión	pmol/L
Valores de referencia	Evaluación del eje hipotálamo-hipofisis-adrenal.

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Aldosterona/Renina (C)
Sinónimos:	Aldosterona/Renina (C)
Código Unificado Andaluz:	B00943
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específica	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	7 días
Volante de petición	Hasta 3,7 ng/mL.
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Se determina semanalmente cuando se tiene una cantidad suficiente de muestras.

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	PLASMA (EDTA)
Tipo de contenedor	Tubo frío con EDTA, tapón morado
Volumen mínimo	40 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Separe el plasma en una centrifugadora refrigerada. Determine las muestras inmediatamente o congélelas a -20°C.

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/mL
Factores de conversión	pmol/L
Valores de referencia	Evaluación del eje hipotálamo-hipofisis-adrenal.

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Aldosterona/Renina actividad suero
Sinónimos:	Aldosterona/Renina Actividad
Código Unificado Andaluz:	BA02812
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	5 días
Volante de petición	Hasta 12,2 ng/mL. Un resultado del cociente superior a 30,0, juntamente c
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Laboratorio externo

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	PLASMA (EDTA)
Tipo de contenedor	Tubo frío con EDTA, tapón morado
Volumen mínimo	2ml
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Separe el plasma en una centrifugadora refrigerada.Determine las muestras inmediatamente o congélelas a -20°C.

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/mL
Factores de conversión	ng/mL
Valores de referencia	Evaluación del eje hipotálamo-hipofisis-adrenal.

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Androstendiona
Sinónimos:	Androstendiona
Código Unificado Andaluz:	CLC12046
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	48-72 horas
Volante de petición	Hombres 0,6 - 3,1 ng/mL // Mujeres 0,3 - 3,3 ng/mL
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Laboratorio Externo

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	1 mL
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/mL
Factores de conversión	nmol/L
Valores de referencia	Marcador de la biosíntesis androgénica.

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Androstendiona (120 min)
Sinónimos:	Androstendiona (120 min)
Código Unificado Andaluz:	CLC12052
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	48-72 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Laboratorio Externo

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/mL
Factores de conversión	nmol/L
Valores de referencia	Marcador de la biosíntesis androgénica.

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Androstendiona (15 min)
Sinónimos:	Androstendiona (15 min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 12049
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	48-72 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Laboratorio Externo

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/mL
Factores de conversión	nmol/L
Valores de referencia	Marcador de la biosíntesis androgénica.

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Androstendiona (30 min)
Sinónimos:	Androstendiona (30 min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 12050
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	48-72 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Laboratorio Externo

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/mL
Factores de conversión	nmol/L
Valores de referencia	Marcador de la biosíntesis androgénica.

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Androstendiona (60 min)
Sinónimos:	Androstendiona (60 min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 12051
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	48-72 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Laboratorio Externo

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/mL
Factores de conversión	nmol/L
Valores de referencia	Marcador de la biosíntesis androgénica.

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Androstendiona (90 min)
Sinónimos:	Androstendiona (90 min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 00950
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	48-72 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Laboratorio Externo

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/mL
Factores de conversión	nmol/L
Valores de referencia	Marcador de la biosíntesis androgénica.

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Anticuerpos anti Receptor TSH
Sinónimos:	Ac anti R TSH
Código Unificado Andaluz:	CLC01595
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	12-24 horas
Volante de petición	0-1,75 UI/mL
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador otubo con heparina de li
Volumen mínimo	20
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	UI/L
Factores de conversión	ku.int./L
Valores de referencia	Diagnóstico diferencial de Enfermedad de Graves

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Anticuerpos anti Tiroglobulina
Sinónimos:	ATG
Código Unificado Andaluz:	CLC00415
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24 horas
Volante de petición	0,9 -4 UI/mL
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de li
Volumen mínimo	10 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	82
Unidades convencionales	UI/mL
Factores de conversión	ku.int./L
Valores de referencia	Detección de tiroiditis de origen autoinmune.

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Anticuerpos peroxidasa del tiroides
Sinónimos:	ATPO
Código Unificado Andaluz:	CLC00061
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	12-24 horas
Volante de petición	0,2 - 9 UI/mL
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	SI
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Ninguna

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	20 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	147
Unidades convencionales	UI/mL
Factores de conversión	ku.int./L
Valores de referencia	Detección de tiroiditis de origen autoinmune.

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Antígeno CA 125
Sinónimos:	CA125
Código Unificado Andaluz:	CLC00815
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	12-24 horas
Volante de petición	<35 U/mL
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI/NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	20 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	54,6
Unidades convencionales	U/mL
Factores de conversión	
Valores de referencia	Evaluación del tratamiento y evolución de pacientes con carcinomas ováric

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Antígeno CA 15.3
Sinónimos:	CA 15.3
Código Unificado Andaluz:	CLC00816
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	12-24 horas
Volante de petición	<31,3 U/mL
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI/NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	20 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	53,5
Unidades convencionales	U/mL
Factores de conversión	
Valores de referencia	Detección precoz de recidivas y control de respuesta a tratamiento en cánc

DEL PARÁMETRO
Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Antígeno CA 19.9
Sinónimos:	CA19.9
Código Unificado Andaluz:	CLC00817
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	12-24 horas
Volante de petición	<35 U/mL
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI/NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	11 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	102
Unidades convencionales	U/mL
Factores de conversión	
Valores de referencia	Evaluación del tratamiento y evolución de pacientes con carcinoma pancre

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Antígeno carcinoembrionario (CEA)
Sinónimos:	CEA
Código Unificado Andaluz:	CLC00814
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específica	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	12-24 horas
Volante de petición	"< 5ng/ml (no fumadores); <10 ng/ml (fumadores)"
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI/NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Ninguna

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	11 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	55,6
Unidades convencionales	mUI/mL
Factores de conversión	ng/mL
Valores de referencia	Evaluación del tratamiento y evolución de pacientes con diferentes tumores

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	1 ng/mL = 16,9 mUI/mL
-------------------------	-----------------------

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Antígeno específico de la próstata (PSA total)
Sinónimos:	PSA
Código Unificado Andaluz:	CLC00820
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	12-24 horas
Volante de petición	<4 ng/mL
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI/NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	20 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	72,4
Unidades convencionales	ng/ml
Factores de conversión	µg/mL
Valores de referencia	Detección del cáncer de próstata.

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Antígeno específico de la próstata libre
Sinónimos:	PSA libre
Código Unificado Andaluz:	CLC00821
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	12-24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI/NO
Dieta previa a la prueba	SI
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	20 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/ml
Factores de conversión	µg/mL
Valores de referencia	Evaluación necesidad de la realización de biopsia para la detección de proc

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Cálculo Riesgo Preeclampsia
Sinónimos:	Ratio sFIT-1/PIGF
Código Unificado Andaluz:	CLC04334
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	12-24 horas
Volante de petición	Semana de gestación
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	60 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	Ratio
Factores de conversión	Ratio
Valores de referencia	Evaluación de riesgo de Preeclampsia gestacional

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Cortisol
Sinónimos:	CORT
Código Unificado Andaluz:	CLC11977
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específica	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	"Valores matutinos, 7-10 A.M.: 184-623,44 nmol/L (6,7-22,6 µg/dL); Valore
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Ninguna

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	20 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	45,6
Unidades convencionales	nmol/L
Factores de conversión	µg/dL
Valores de referencia	Función o disfunción de las glándulas suprarrenales, la hipófisis y el hipotál

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	"nmol/L x 0,03625 = µg/dL; nmol/L x 0,3625 = µg/L; µg/dL x 27,586 = nmol/L; µg/L x 2,7586 = nmol/L"
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Cortisol (20:00h)
Sinónimos:	Srm- Cortisol (20:00h)
Código Unificado Andaluz:	CLC 12022
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	12-24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	
Supresión de fármacos anterior a la prueba	
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Cortisol (24h)
Sinónimos:	Cortisol orina 24h
Código Unificado Andaluz:	CLC 12026
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Ninguna

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Orina 24 h
Tipo de contenedor	Tubo vacío tapón beige (O24h)
Volumen mínimo	50 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	µg/dL
Factores de conversión	µg/dL
Valores de referencia	Función o disfunción de las glándulas suprarrenales, la hipófisis y el hipotálamo

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Enolasa Especifica Neuronal
Sinónimos:	NSE
Código Unificado Andaluz:	CLC00823
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	12-24 horas
Volante de petición	<18,3 ng/ml
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI/NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/ml
Factores de conversión	µg/mL
Valores de referencia	Seguimiento tumor cerebral, tumor neuroendocrino y cáncer de pulmón.

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Estradiol
Sinónimos:	Estradiol
Código Unificado Andaluz:	CLC 11837
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específica	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Sexo y fase ciclo ovulatorio
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Ninguna

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	35 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	pmol/L
Factores de conversión	pmol/L, pg/mL, ng/L, nmol/L
Valores de referencia	Trastornos de fertilidad, ginecomastias, tumores productores de estrógeno

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	pmol/L x 0,273 = pg/mL (ng/L), pg/mL x 3,67 = pmol/L
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Estradiol (180 min)
Sinónimos:	Estradiol (180 min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11141
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Sexo y fase ciclo ovulatorio
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Ninguna

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	pmol/L
Factores de conversión	pmol/L, pg/mL, ng/L, nmol/L
Valores de referencia	Trastornos de fertilidad, ginecomastias, tumores productores de estrógeno

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	pmol/L x 0,273 = pg/mL (ng/L), pg/mL x 3,67 = pmol/L
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Factor de crecimiento insulinoide I
Sinónimos:	Factor de crecimiento insulinoide I
Código Unificado Andaluz:	CLC 11036
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específica	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	7 días
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Ninguna

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/mL
Factores de conversión	nmol/L
Valores de referencia	Diagnosticar trastornos de la hormona del crecimiento.

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Folato
Sinónimos:	Folato/Ácido fólico
Código Unificado Andaluz:	CLC 00811
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específica	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	"10,4-42,4 nmol/L; 4,6-18,7 ng/mL"
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Ninguna

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	25 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	-
Unidades convencionales	
Factores de conversión	nmol/L ó ng/mL
Valores de referencia	Déficit de folato.

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	"nmol/L x 0,44 = ng/ML; ng/mL x 2,27 = nmol/L"
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Globulina fijadora de hormonas sexuales
Sinónimos:	SHGB
Código Unificado Andaluz:	CLC 11875
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	24 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	
Supresión de fármacos anterior a la prueba	
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	nmol/L
Factores de conversión	nmol/L
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Gonadotropina
Sinónimos:	Gonadotropina/BHCG
Código Unificado Andaluz:	
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	12-24 horas
Volante de petición	Según sexo, menopausia o edad gestacional
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI/NO
Dieta previa a la prueba	SI
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	10 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	-
Unidades convencionales	mUI/mL o UI/L
Factores de conversión	mUI/mL o UI/L
Valores de referencia	Cribado aneuploidías en gestación, control enfermedades malignas.

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Gonadotropina
Sinónimos:	BHCG marcador Tumoral
Código Unificado Andaluz:	CLC11918
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	12-24 horas
Volante de petición	<0,6 UI/L
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI/NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	20 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	UI/L
Factores de conversión	UI/L
Valores de referencia	Evaluación del tratamiento y evolución de pacientes con tumor gonadal .

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Hormona Antimulleriana
Sinónimos:	AMH
Código Unificado Andaluz:	CLC 02822
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	0,5 - 7,15 ng/mL
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/mL
Factores de conversión	µg/L
Valores de referencia	Evaluación de la reserva ovárica principalmente para predecir la respuesta

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	0,5-7,5 ng/mL
-------------------------	---------------

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Hormona folículoestimulante
Sinónimos:	Folitropina/FSH
Código Unificado Andaluz:	CLC 11797
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	24 horas
Volante de petición	Sexo y fase del ciclo ovulatorio
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Ninguna

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	18
Unidades convencionales	mUI/ml
Factores de conversión	u.int./L
Valores de referencia	Reconocimiento de trastornos funcionales en el eje hipotálamo, hipófisis y

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Hormona folículoestimulante (120 min)
Sinónimos:	Folitropina/ FSH (120 min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11814
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Sexo y fase del ciclo ovulatorio
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	
Supresión de fármacos anterior a la prueba	
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	mUI/ml
Factores de conversión	u.int./L
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Hormona folículoestimulante (180 min)
Sinónimos:	Folitropina/FSH (180 min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11815
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Sexo y fase del ciclo ovulatorio
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	
Supresión de fármacos anterior a la prueba	
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	mUI/ml
Factores de conversión	u.int./L
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Hormona folículoestimulante (20 min)
Sinónimos:	Folitropina/FSH (20 min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11806
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Sexo y fase del ciclo ovulatorio
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	
Supresión de fármacos anterior a la prueba	
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	mUI/ml
Factores de conversión	u.int./L
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Hormona folículoestimulante (30 min)
Sinónimos:	Folitropina/FSH (30 min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11807
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Sexo y fase del ciclo ovulatorio
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	
Supresión de fármacos anterior a la prueba	
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	mUI/ml
Factores de conversión	u.int./L
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Hormona folículoestimulante (60 min)
Sinónimos:	Folitropina/ FSH (60 min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11810
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Sexo y fase del ciclo ovulatorio
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	
Supresión de fármacos anterior a la prueba	
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	mUI/ml
Factores de conversión	u.int./L
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Hormona folículoestimulante (90 min)
Sinónimos:	Folitropin/ FSH (90 min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11812
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Sexo y fase del ciclo ovulatorio
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Ninguna

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales
Unidades convencionales
Factores de conversión
Valores de referencia

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Hormona luteinizante
Sinónimos:	Lutropina
Código Unificado Andaluz:	CLC 11816
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24 horas
Volante de petición	Sexo, fase del ciclo ovulatorio
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	SI
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	20 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	27,8
Unidades convencionales	mUI/mL
Factores de conversión	mu.int./L
Valores de referencia	Trastornos funcionales en el eje hipotálamo, hipófisis y gonadas

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Hormona luteinizante (180 min)
Sinónimos:	Lutropina/ LH (180 min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11834
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Sexo, fase del ciclo ovulatorio

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	SI
Supresión de fármacos anterior a la prueba	
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	mUI/mL
Factores de conversión	mu.int./L
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Hormona luteinizante (30 min)
Sinónimos:	Lutropina/LH (30 min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11825
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Sexo, fase del ciclo ovulatorio

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	SI
Supresión de fármacos anterior a la prueba	
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	mUI/mL
Factores de conversión	mu.int./L
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Hormona luteinizante (90 min)
Sinónimos:	Lutropina/LH (90 min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11831
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Sexo, fase del ciclo ovulatorio

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	SI
Supresión de fármacos anterior a la prueba	
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	mUI/mL
Factores de conversión	mu.int./L
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Hormona luteinizante(150 min)
Sinónimos:	Lutropina/ LH (150 min)
Código Unificado Andaluz:	BA 20276
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Sexo, fase del ciclo ovulatorio

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	SI
Supresión de fármacos anterior a la prueba	
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	mUI/mL
Factores de conversión	mu.int./L
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Hormona luteinizante(20 min)
Sinónimos:	Lutropina/ LH (20 min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11824
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Sexo, fase del ciclo ovulatorio

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	SI
Supresión de fármacos anterior a la prueba	
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	mUI/mL
Factores de conversión	mu.int./L
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Hormona Paratiroide Basal
Sinónimos:	Paratrina Basal/PTH basal/ Paratohormona basal
Código Unificado Andaluz:	CLC 11070
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	1 hora
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	
Supresión de fármacos anterior a la prueba	
Otras consideraciones	Determinación intraoperatoria.

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	pg/ml
Factores de conversión	pmol/L
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Hormona Paratiroide Basal (Tiempo 1 Extirpación)
Sinónimos:	Paratrina/PTH(Tiempo 1 Extirpación)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11071
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1 hora
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	
Supresión de fármacos anterior a la prueba	
Otras consideraciones	Determinación intraoperatoria.

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	pg/ml
Factores de conversión	pmol/L
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Hormona Paratiroide Basal (Tiempo 2 Extirpación)
Sinónimos:	Paratrina/PTH (Tiempo 2 Extirpación)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11638
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1 hora
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	
Supresión de fármacos anterior a la prueba	
Otras consideraciones	Determinación intraoperatoria.

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	pg/ml
Factores de conversión	pmol/L
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Hormona paratiroide intacta
Sinónimos:	Paratirina/PTHi/Paratohormona intacta
Código Unificado Andaluz:	CLC 11015
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	12-24 horas
Volante de petición	15-65 pg/mL (1,6-6,9 pmol/L)
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	SI
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	50 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	-
Unidades convencionales	pg/ml
Factores de conversión	pmol/L
Valores de referencia	Diagnóstico diferencial entre la hiper- y la hipocalcemia

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	pg/mL x 0,106 = pmol/L, pmol/L x 9,43 = pg/mL
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Hormona tirotrópica
Sinónimos:	Tirotropina, TSH
Código Unificado Andaluz:	CLC 00033
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	24 horas
Volante de petición	0,380-5,330 µUI/mL
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	50 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	-
Unidades convencionales	µUI/mL
Factores de conversión	mu.int./L
Valores de referencia	Diagnóstico de la enfermedad tiroidea.

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Hormona tirotrona (0min)
Sinónimos:	Tirotropina, TSH (0min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11300
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	50 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	µUI/mL
Factores de conversión	mu.int./L
Valores de referencia	Diagnóstico de la enfermedad tiroidea.

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Hormona tirotrona (120 min)
Sinónimos:	Tirotropina, TSH (120 min)
Código Unificado Andaluz:	CLC11299
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	50 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	µUI/mL
Factores de conversión	mu.int./L
Valores de referencia	Diagnóstico de la enfermedad tiroidea.

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Hormona tirotrona (20min)
Sinónimos:	Tirotropina, TSH (20min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11297
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	50 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	µUI/mL
Factores de conversión	mu.int./L
Valores de referencia	Diagnóstico de la enfermedad tiroidea.

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Hormona tirotrona (30min)
Sinónimos:	Tirotropina, TSH (30min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11296
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	50 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	µUI/mL
Factores de conversión	mu.int./L
Valores de referencia	Diagnóstico de la enfermedad tiroidea.

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Hormona tirotrona (60 min)
Sinónimos:	Tirotropina, TSH (60 min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11295
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	50 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	µUI/mL
Factores de conversión	mu.int./L
Valores de referencia	Diagnóstico de la enfermedad tiroidea.

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Hormona tirotrona (90 min)
Sinónimos:	Tirotropina, TSH (90 min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11275
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	50 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	µUI/mL
Factores de conversión	mu.int./L
Valores de referencia	Diagnóstico de la enfermedad tiroidea.

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Índice de Testosterona libre
Sinónimos:	Testosterona libre, Índice (C)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11876
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específica	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24 horas
Volante de petición	Edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	Ratio %
Factores de conversión	x1
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Inmunoglobulina E
Sinónimos:	IGE
Código Unificado Andaluz:	601225 IGE
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	12-24 horas
Volante de petición	Según edad
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI/NO
Dieta previa a la prueba	SI
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	10 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	-
Unidades convencionales	UI/mL
Factores de conversión	ng/mL
Valores de referencia	Diferenciación entre una afección atópica y una no atópica

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	UI/mL x 2,40 = ng/MI, ng/mL x 0,42 = UI/mL
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Insulina
Sinónimos:	INS
Código Unificado Andaluz:	CLC 11020
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específica	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	24 horas
Volante de petición	2,6-24,9 µU/mL (17,8-173 pmol/L)
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	SI
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	20 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	58,3
Unidades convencionales	"µU/mL; pmol/L"
Factores de conversión	mu.int./L
Valores de referencia	Alteración metabolismo hidrocarbonado

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	µU/mL x 6,945 = pmol/L, pmol/L x 0,144 = µU/mL
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Insulina (120 min)
Sinónimos:	Insulina (120 min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11331
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	SI
Supresión de fármacos anterior a la prueba	
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	"µU/mL; pmol/L"
Factores de conversión	mu.int./L
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	µU/mL x 6,945 = pmol/L, pmol/L x 0,144 = µU/mL
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Insulina (180 min)
Sinónimos:	Insulina (180 min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11328
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	SI
Supresión de fármacos anterior a la prueba	
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	"µU/mL; pmol/L"
Factores de conversión	mu.int./L
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	µU/mL x 6,945 = pmol/L, pmol/L x 0,144 = µU/mL
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Insulina (240 min)
Sinónimos:	Insulina (240 min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11327
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	SI
Supresión de fármacos anterior a la prueba	
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	"µU/mL; pmol/L"
Factores de conversión	mu.int./L
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	µU/mL x 6,945 = pmol/L, pmol/L x 0,144 = µU/mL
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Insulina (30 min)
Sinónimos:	Insulina (30 min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11319
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	SI
Supresión de fármacos anterior a la prueba	
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	"µU/mL; pmol/L"
Factores de conversión	mu.int./L
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	µU/mL x 6,945 = pmol/L, pmol/L x 0,144 = µU/mL
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Insulina (300 min)
Sinónimos:	Insulina (300 min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11325
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	SI
Supresión de fármacos anterior a la prueba	
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	"µU/mL; pmol/L"
Factores de conversión	mu.int./L
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	µU/mL x 6,945 = pmol/L, pmol/L x 0,144 = µU/mL
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Insulina (60 min)
Sinónimos:	Insulina (60 min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11322
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	SI
Supresión de fármacos anterior a la prueba	
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	"µU/mL; pmol/L"
Factores de conversión	mu.int./L
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	µU/mL x 6,945 = pmol/L, pmol/L x 0,144 = µU/mL
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Insulina (90 min)
Sinónimos:	Insulina (90 min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11320
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	SI
Supresión de fármacos anterior a la prueba	
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	"µU/mL; pmol/L"
Factores de conversión	mu.int./L
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	µU/mL x 6,945 = pmol/L, pmol/L x 0,144 = µU/mL
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Isoenzima MB de la creatin kinasa
Sinónimos:	CK-MB
Código Unificado Andaluz:	CLC00544
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	365 días, 24 horas
Tiempo de respuesta	1 hora
Volante de petición	0,6-6,3 ng/mL
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Ninguna

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	15 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	61,2
Unidades convencionales	ng/mL ó µg/L
Factores de conversión	ng/mL ó µg/L
Valores de referencia	Diagnóstico de la isquemia miocárdica, rabdomiolisis y apoplejía

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Mioglobina
Sinónimos:	MYO
Código Unificado Andaluz:	CLC00642
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	365 días, 24 horas
Tiempo de respuesta	1 hora
Volante de petición	"Hombres: 28-72 ng/mL; Mujeres: 25-58 ng/mL"
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI/NO
Dieta previa a la prueba	SI
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	29,6
Unidades convencionales	
Factores de conversión	ng/mL ó µg/L
Valores de referencia	éxito de la terapia.

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Péptido C
Sinónimos:	PEPTIDO C
Código Unificado Andaluz:	CLC11023
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	12-24 horas
Volante de petición	1,1-4,4 ng/mL, 0,37-1,47 nmol/L
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	SI
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Ninguna

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	-
Unidades convencionales	ng/mL
Factores de conversión	nmol/L o pmol/L
Valores de referencia	Diagnóstico diferencial de hipoglucemia

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	ng/mL (µg/L) x 0,33333 = nmol/L, ng/mL x 333,33 = pmol/L, nmol/L x 3,0 = ng/mL, pmol/L x 0,003 = ng/mL
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Péptido C (120min)
Sinónimos:	Péptido C (120min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11338
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Ninguna

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/mL
Factores de conversión	nmol/L o pmol/L
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Péptido C (180min)
Sinónimos:	Péptido C (180min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11335
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Ninguna

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/mL
Factores de conversión	nmol/L o pmol/L
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Péptido C (30min)
Sinónimos:	Péptido C (30min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11344
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Ninguna

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/mL
Factores de conversión	nmol/L o pmol/L
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Péptido C (60min)
Sinónimos:	Péptido C (60min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11336
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Ninguna

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/mL
Factores de conversión	nmol/L o pmol/L
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Péptido C (6min)
Sinónimos:	Péptido C (6min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11342
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Ninguna

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/mL
Factores de conversión	nmol/L o pmol/L
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Péptido C (90min)
Sinónimos:	Péptido C (90min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11333
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Ninguna

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/mL
Factores de conversión	nmol/L o pmol/L
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Péptido Natriurético Cerebral
Sinónimos:	BNP
Código Unificado Andaluz:	CLC 12181
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Ninguna

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	"ppg/mL; ng/ml"
Factores de conversión	"pg/mL; ng/ml"
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- proBNP
Sinónimos:	proBNP
Código Unificado Andaluz:	CLC12187
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	12-24 horas
Volante de petición	<125 pg/mL
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI/NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	20 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	-
Unidades convencionales	
Factores de conversión	"pmol/l; pg/ml"
Valores de referencia	Diagnóstico de pacientes bajo sospecha de sufrir una insuficiencia cardíaca

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	"pmol/l x 8,457 = pg/ml; pg/ml x 0,118 = pmol/l"
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Progesterona
Sinónimos:	PROG
Código Unificado Andaluz:	CLC 11846
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24 horas
Volante de petición	"Hombres: 0,7-4,3 nmol/L; Mujeres: fase folicular: 0,6-4,7; f. ovulatoria: 2,
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	SI
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	30 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	nmol/L
Factores de conversión	ng/mL
Valores de referencia	Comprobación de la ovulación y control de fase lútea en el diagnóstico de l

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	"nmol/L x 0,314 = ng/mL; ng/mL x 3,18= nmol/L"
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Prolactina
Sinónimos:	PRL
Código Unificado Andaluz:	CLC 11775
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	24 horas
Volante de petición	"Mujeres: <50 años desde 3,34-26,72 ng/mL; >50 años desde 3,3-19,64 ng
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Existen fármacos pueden disminuir sus valores como la L-Dopa o Bromocriptina, así como otros aumentar sus niveles como la Fenotiazina y la reserpina

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	61,2
Unidades convencionales	µUI/mL, mUI/L
Factores de conversión	ng/mL
Valores de referencia	Alteraciones de la fertilidad, carcinoma de mama y tumor hipofisario

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	µUI/mL (mUI/L) x 0,047 = ng/mL, ng/mL x 21,2 = µUI/mL(mUI/L)
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Prolactina (120min)
Sinónimos:	PRL (120min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11789
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Sexo, fase del ciclo ovulatorio
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Existen fármacos pueden disminuir sus valores como la L-Dopa o Bromocriptina, así como otros aumentar sus niveles como la Fenotiazina y la reserpina

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	µUI/mL, mUI/L
Factores de conversión	ng/mL
Valores de referencia	Alteraciones de la fertilidad, carcinoma de mama y tumor hipofisario

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Prolactina (180min)
Sinónimos:	PRL (180min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11790
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Sexo, fase del ciclo ovulatorio
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Existen fármacos pueden disminuir sus valores como la L-Dopa o Bromocriptina, así como otros aumentar sus niveles como la Fenotiazina y la reserpina

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	µUI/mL, mUI/L
Factores de conversión	ng/mL
Valores de referencia	Alteraciones de la fertilidad, carcinoma de mama y tumor hipofisario

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Prolactina (20min)
Sinónimos:	PRL (20 min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11782
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Sexo, fase del ciclo ovulatorio
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Existen fármacos pueden disminuir sus valores como la L-Dopa o Bromocriptina, así como otros aumentar sus niveles como la Fenotiazina y la reserpina

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	µUI/mL, mUI/L
Factores de conversión	ng/mL
Valores de referencia	Alteraciones de la fertilidad, carcinoma de mama y tumor hipofisario

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Prolactina (30min)
Sinónimos:	PRL (30min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11783
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Sexo, fase del ciclo ovulatorio
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Existen fármacos pueden disminuir sus valores como la L-Dopa o Bromocriptina, así como otros aumentar sus niveles como la Fenotiazina y la reserpina

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	µUI/mL, mUI/L
Factores de conversión	ng/mL
Valores de referencia	Alteraciones de la fertilidad, carcinoma de mama y tumorhipofisario

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Prolactina (60min)
Sinónimos:	PRL (60min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11787
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Sexo, fase del ciclo ovulatorio
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Existen fármacos pueden disminuir sus valores como la L-Dopa o Bromocriptina, así como otros aumentar sus niveles como la Fenotiazina y la reserpina

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	µUI/mL, mUI/L
Factores de conversión	ng/mL
Valores de referencia	Alteraciones de la fertilidad, carcinoma de mama y tumorhipofisario

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Prolactina (90min)
Sinónimos:	PRL (90min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11788
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Sexo, fase del ciclo ovulatorio
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Existen fármacos pueden disminuir sus valores como la L-Dopa o Bromocriptina, así como otros aumentar sus niveles como la Fenotiazina y la reserpina

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	µUI/mL, mUI/L
Factores de conversión	ng/mL
Valores de referencia	Alteraciones de la fertilidad, carcinoma de mama y tumor hipofisario

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Prolactina Macroforma (cribado)
Sinónimos:	PRL Macroforma/ Macroprolactina
Código Unificado Andaluz:	CLC 11796
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	72-96 horas
Volante de petición	Se considera presencia de MACROPROLACTINA, cuando el porcentaje de r
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Existen fármacos pueden disminuir sus valores como la L-Dopa o Bromocriptina, así como otros aumentar sus niveles como la Fenotiazina y la reserpina

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	µUI/mL, mUI/L
Factores de conversión	ng/mL
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Somatotropina
Sinónimos:	GH
Código Unificado Andaluz:	CLC 11032
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	24 horas
Volante de petición	0-7 ng/mL
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	35 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/mL
Factores de conversión	pmol/L
Valores de referencia	Evaluar la hormona del crecimiento deficiencia en niños y adultos jóvenes.

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Somatotropina (0 min)
Sinónimos:	GH (0min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11374
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	35 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/mL
Factores de conversión	pmol/L
Valores de referencia	Evaluar la hormona del crecimiento deficiencia en niños y adultos jóvenes.

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Somatotropina (120 min)
Sinónimos:	GH (120 min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11372
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	35 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/mL
Factores de conversión	pmol/L
Valores de referencia	Evaluar la hormona del crecimiento deficiencia en niños y adultos jóvenes.

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Somatotropina (15 min)
Sinónimos:	GH (15min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11709
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	35 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/mL
Factores de conversión	pmol/L
Valores de referencia	Evaluar la hormona del crecimiento deficiencia en niños y adultos jóvenes.

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Somatotropina (150 min)
Sinónimos:	GH (150 min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11369
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	35 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/mL
Factores de conversión	pmol/L
Valores de referencia	Evaluar la hormona del crecimiento deficiencia en niños y adultos jóvenes.

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Somatotropina (180 min)
Sinónimos:	GH (180min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11710
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	35 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/mL
Factores de conversión	pmol/L
Valores de referencia	Evaluar la hormona del crecimiento deficiencia en niños y adultos jóvenes.

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Somatotropina (20 min)
Sinónimos:	GH (20min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11375
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	35 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/mL
Factores de conversión	pmol/L
Valores de referencia	Evaluar la hormona del crecimiento deficiencia en niños y adultos jóvenes.

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Somatotropina (30 min)
Sinónimos:	GH (30min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11376
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	35 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/mL
Factores de conversión	pmol/L
Valores de referencia	Evaluar la hormona del crecimiento deficiencia en niños y adultos jóvenes.

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Somatotropina (45 min)
Sinónimos:	GH (45min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11716
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	35 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/mL
Factores de conversión	pmol/L
Valores de referencia	Evaluar la hormona del crecimiento deficiencia en niños y adultos jóvenes.

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Somatotropina (60 min)
Sinónimos:	GH (60 min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11368
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	35 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/mL
Factores de conversión	pmol/L
Valores de referencia	Evaluar la hormona del crecimiento deficiencia en niños y adultos jóvenes.

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Somatotropina (90min)
Sinónimos:	GH (90 min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11379
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	35 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/mL
Factores de conversión	pmol/L
Valores de referencia	Evaluar la hormona del crecimiento deficiencia en niños y adultos jóvenes.

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Subclase Inmunoglobulina G1
Sinónimos:	SUBCLASE IG 1
Código Unificado Andaluz:	CLC00454
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 14 horas.
Tiempo de respuesta	10 días
Volante de petición	60-75% de IGG
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Si, 8 h
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	No
Otras consideraciones	NO

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Sangre total
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	Después de retracción de coágulo (60min) separar suero limpio y congelar
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	mg/dL
Factores de conversión	
Valores de referencia	Las cuatro subclases IgG presentandiferencias considerables en sus propie

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Subclase Inmunoglobulina G2
Sinónimos:	SUBCLASE IG 2
Código Unificado Andaluz:	CLC00455
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específica	Lunes a viernes de 8:30 a 14 horas.
Tiempo de respuesta	10 días
Volante de petición	15-30% de IIG
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Si, 8 h
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	No
Otras consideraciones	NO

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Sangre total
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	Después de retracción de coágulo (60min) separar suero limpio y congelar
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	mg/dL
Factores de conversión	
Valores de referencia	Las cuatro subclases IgG presentandiferencias considerables en sus propie

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Subclase Inmunoglobulina G3
Sinónimos:	SUBCLASE IG 3
Código Unificado Andaluz:	CLC00456
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 14 horas.
Tiempo de respuesta	10 días
Volante de petición	5-15% de IIG
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Si, 8 h
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	No
Otras consideraciones	NO

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Sangre total
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	Después de retracción de coágulo (60min) separar suero limpio y congelar
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	mg/dL
Factores de conversión	
Valores de referencia	Las cuatro subclases IgG presentandiferencias considerables en sus propie

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Subclase Inmunoglobulina G4
Sinónimos:	SUBCLASE IG 4
Código Unificado Andaluz:	CLC00457
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 14 horas.
Tiempo de respuesta	10 días
Volante de petición	<10% de IIG
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Si, 8 h
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	No
Otras consideraciones	NO

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Sangre total
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	Después de retracción de coágulo (60min) separar suero limpio y congelar
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	Después de retracción de coágulo (60min) separar suero limpio

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	mg/dL
Factores de conversión	
Valores de referencia	Las cuatro subclases IgG presentandiferencias considerables en sus propie

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Sulfato de deshidroepiandrosterona
Sinónimos:	DHEA
Código Unificado Andaluz:	CLC 12055
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Ninguna

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	15 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	21
Unidades convencionales	µg/dL
Factores de conversión	µmol/L
Valores de referencia	Marcador útil para la evaluación de la producción suprarrenal.

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	$\mu\text{mol/L} \times 36,846 = \mu\text{g/dL}$, $\mu\text{g/dL} \times 0,02714 = \mu\text{mol/L}$, $\mu\text{g/dL} \times 0,01 = \mu\text{g/mL}$
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Testosterona
Sinónimos:	Testosterona
Código Unificado Andaluz:	CLC 11854
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	24 horas
Volante de petición	Edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	20 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	23,7
Unidades convencionales	nmol/L
Factores de conversión	nmol/L
Valores de referencia	Trastornos hormonales en ambos sexos.

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	ng/mL x 3,47 = nmol/L, ng/mL x 100 = ng/DI, nmol/L x 0,288 = ng/mL
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Testosterona (180 min)
Sinónimos:	Testosterona (180 min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11143
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	20 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/L
Factores de conversión	nmol/L
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	ng/mL x 3,47 = nmol/L, ng/mL x 100 = ng/DI, nmol/L x 0,288 = ng/mL
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Testosterona Libre
Sinónimos:	Testosterona Libre
Código Unificado Andaluz:	CLC 11869
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	24 horas
Volante de petición	Edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	20 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	nmol/L
Factores de conversión	pmol/L
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	ng/mL x 3,47 = nmol/L, ng/mL x 100 = ng/DI, nmol/L x 0,288 = ng/mL
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Tiroxina libre
Sinónimos:	T4L
Código Unificado Andaluz:	CLC 00034
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	12-24 horas
Volante de petición	12-22 pmol/L (0,93-1,7 ng/dL)
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	SI
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	15 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	12,2
Unidades convencionales	ng/L
Factores de conversión	pmol/L
Valores de referencia	Diagnóstico diferencial de los estados hipo-, hiper- y eutiroides.

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	$\text{pmol/L} \times 0,077688 = \text{ng/dL}$, $\text{ng/dL} \times 12,872 = \text{pmol/L}$, $\text{pmol/L} \times 0,77688 = \text{ng/L}$
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Troponina T ultrasensible
Sinónimos:	Troponina T ultrasensible
Código Unificado Andaluz:	CLC00644
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	60 minutos
Volante de petición	12,7-24,9 ng/mL
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI/NO
Dieta previa a la prueba	SI
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	50 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	-
Unidades convencionales	µUI/mL ó mUI/L
Factores de conversión	pg/mL, ng/mL
Valores de referencia	Diagnóstico diferencial de síndrome coronario agudo.

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Vitamina B12
Sinónimos:	Vitamina B12
Código Unificado Andaluz:	CLC00805
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	12-24 horas
Volante de petición	116-513 pg/mL
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI/NO
Dieta previa a la prueba	SI
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	50 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	69
Unidades convencionales	pmol/L
Factores de conversión	pg/mL
Valores de referencia	Diagnóstico diferencial de anemia megaloblástica.

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	$\text{pmol/L} \times 1,36 = \text{pg/mL}$ $\text{pg/mL} \times 0,738 = \text{pmol/L}$
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm- Vitamina D(25 OH Hidroxilada)
Sinónimos:	VIT-D (25 OH)
Código Unificado Andaluz:	CLC 00807
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	12-24 horas
Volante de petición	14-100 ng/mL
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	35 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	-
Unidades convencionales	ng/mL
Factores de conversión	nmol/L
Valores de referencia	Déficit y toxicidad de vitamina D.

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	"nmol/L x 0,40 = ng/ML; ng/mL x 2,50 = nmol/L"
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-17- Hidroxiprogesterona (30 min)
Sinónimos:	17- Hidroxiprogesterona (30 min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 12042
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	72-96 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Ninguna

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador otubo con heparina de li
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/mL
Factores de conversión	nmol/L
Valores de referencia	Diagnóstico y seguimiento de la deficiencia enzimática responsable de la hi

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-17-alfa-hidroxipregnenolona (60min)
Sinónimos:	17-?-Hidroxi-pregnenolona (60 min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 06782
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	72-96 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Ninguna

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador otubo con heparina de li
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/mL
Factores de conversión	nmol/L
Valores de referencia	Diagnóstico y seguimiento de la deficiencia enzimática responsable de la hi

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-17-Hidroxiprogesterona (120min)
Sinónimos:	17-Hidroxiprogesterona (120min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 12045
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	72-96 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Ninguna

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador otubo con heparina de li
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/mL
Factores de conversión	nmol/L
Valores de referencia	Diagnóstico y seguimiento de la deficiencia enzimática responsable de la hi

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-17-Hidroxiprogesterona (15min)
Sinónimos:	17-Hidroxiprogesterona (15 min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 12041
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	72-96 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Ninguna

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador otubo con heparina de li
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/mL
Factores de conversión	nmol/L
Valores de referencia	Diagnóstico y seguimiento de la deficiencia enzimática responsable de la hi

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Adalumumad nivel
Sinónimos:	Adalumumad nivel
Código Unificado Andaluz:	CLC04372
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 14 horas.
Tiempo de respuesta	10 días
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	No
Otras consideraciones	NO

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Sangre total
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	Después de retracción de coágulo (60min) separar suero limpio y congelar
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/mL
Factores de conversión	
Valores de referencia	La identificación de las concentraciones farmacológicas puede ser importan

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Albúmina (EF)
Sinónimos:	Albúmina (EF)
Código Unificado Andaluz:	CLC00609
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas.
Tiempo de respuesta	2-4 días
Volante de petición	3,24-5,28
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Sí

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	No
Otras consideraciones	NO

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Sangre total
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	Después de retracción de coágulo (60min) separar suero limpio
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	g/dL
Factores de conversión	Porcentaje de células que se marcan para inmunoglobulina de superficie la
Valores de referencia	"La albúmina tiene una función importante: evitar que el líquido del torrent

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Albúmina (porcentaje)
Sinónimos:	Albúmina (porcentaje)
Código Unificado Andaluz:	CLC00618
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 14 horas.
Tiempo de respuesta	2-4 días
Volante de petición	54,7-66
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Si, 8 h
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	No
Otras consideraciones	NO

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Sangre total
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	Después de retracción de coágulo (60min) separar suero limpio
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	%
Factores de conversión	
Valores de referencia	El proteinograma es útil para orientar un diagnóstico, precisar la gravedad

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Alfa-1-Globulina (EF)
Sinónimos:	Alfa-1-Globulina (EF)
Código Unificado Andaluz:	CLC00611
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 14 horas.
Tiempo de respuesta	2-4 días
Volante de petición	0,08-,22
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Si, 8 h
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	No
Otras consideraciones	NO

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Sangre total
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	Después de retracción de coágulo (60min) separar suero limpio
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	g/dL
Factores de conversión	
Valores de referencia	La alfa-1 antitripsina (AAT) es una proteína que protege los pulmones. El h

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Alfa-1-Globulina (porcentaje)
Sinónimos:	Alfa-1-Globulina (porcentaje)
Código Unificado Andaluz:	CLC00620
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específica	Lunes a viernes de 8:30 a 14 horas.
Tiempo de respuesta	2-4 días
Volante de petición	1,4-2,8
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Si, 8 h
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	No
Otras consideraciones	NO

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Sangre total
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	Después de retracción de coágulo (60min) separar suero limpio
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	%
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Alfa-2-Globulina (EF)
Sinónimos:	Alfa-2-Globulina (EF)
Código Unificado Andaluz:	CLC00612
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 14 horas.
Tiempo de respuesta	2-4 días
Volante de petición	0,55-1,1
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Si, 8 h
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	No
Otras consideraciones	NO

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Sangre total
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	Después de retracción de coágulo (60min) separar suero limpio
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	g/dL
Factores de conversión	
Valores de referencia	Las alfa-2 globulinas aumentan en la sangre si se produce daño a los tejidos

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Alfa-2-Globulina (porcentaje)
Sinónimos:	Alfa-2-Globulina (porcentaje)
Código Unificado Andaluz:	CLC00621
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específica	Lunes a viernes de 8:30 a 14 horas.
Tiempo de respuesta	2-4 días
Volante de petición	9,1-13,8
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Si, 8 h
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	No
Otras consideraciones	NO

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Sangre total
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	Después de retracción de coágulo (60min) separar suero limpio
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	%
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Alfa-Fetoproteína
Sinónimos:	AFP marcador Tumoral
Código Unificado Andaluz:	CLC00813
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específica	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	12-24 horas
Volante de petición	<9
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI/NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	20 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/ml
Factores de conversión	µg/mL
Valores de referencia	Evaluación del tratamiento y evolución de pacientes con tumor gonadal y h

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Amikacina pico
Sinónimos:	Amikacina pico
Código Unificado Andaluz:	CLC02508
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 14 horas.
Tiempo de respuesta	2-4 días
Volante de petición	Depende del tipo de infección
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	Kanamicina
Otras consideraciones	NO

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Sangre total
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	Después de retracción de coágulo (60min) separar suero limpio
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ug/mL
Factores de conversión	umol/L
Valores de referencia	Las mediciones obtenidas sirven para diagnosticar y tratar las sobredosis d

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	1,71
-------------------------	------

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Amikacina valle
Sinónimos:	Amikacina valle
Código Unificado Andaluz:	CLC02509
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 14 horas.
Tiempo de respuesta	2-4 días
Volante de petición	Concentraciones mínimas de amicacina de 1–4 µg/mL (1,7–6,8 µmol/L) par
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	Kanamicina
Otras consideraciones	NO

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Sangre total
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	Después de retracción de coágulo (60min) separar suero limpio
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	µg/mL
Factores de conversión	µmol/L
Valores de referencia	Las mediciones obtenidas sirven para diagnosticar y tratar las sobredosis d

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	1,71
-------------------------	------

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Bandas oliclonales (interpretación)
Sinónimos:	Bandas oliclonales (interpretación)
Código Unificado Andaluz:	BA00196
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 14 horas.
Tiempo de respuesta	15 días
Volante de petición	Normalmente, se debe encontrar menos de 2 bandas en el LCR.
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	No
Otras consideraciones	NO

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Sangre total
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	Presencia/Ausencia
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Bandas oligoclonales IgG LCR
Sinónimos:	Bandas oligoclonales LCR IgG
Código Unificado Andaluz:	CLC20076
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específica	Lunes a viernes de 8:30 a 14 horas.
Tiempo de respuesta	15 días
Volante de petición	Normalmente, se debe encontrar menos de 2 bandas en el LCR.
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	No

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	No
Otras consideraciones	Requisito indispensable remitir suero y LCR

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	LCR + Sangre total
Tipo de contenedor	Tubo tapón verde + Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	100 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	LCR: refrigerar. Suero: después de retracción de coágulo (60min) separar suero limpio y congelar
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	LCR y suero obtenido. Transporte refrigerados
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	Presencia/Ausencia
Valores de referencia	Este examen ayuda a sustentar, mas no confirma, el diagnóstico de esclerosis

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Beta-Globulina (EF)
Sinónimos:	Beta-Globulina (EF)
Código Unificado Andaluz:	CLC00613
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 14 horas.
Tiempo de respuesta	2-4 días
Volante de petición	0,52-1,15
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Si, 8 h
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	No
Otras consideraciones	NO

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Sangre total
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	Después de retracción de coágulo (60min) separar suero limpio
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	g/dL
Factores de conversión	
Valores de referencia	Las globulinas beta engloban la hemopexina, encargada de fijar y transportar

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Beta-Globulina (porcentaje)
Sinónimos:	Beta-Globulina (porcentaje)
Código Unificado Andaluz:	CLC00622
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 14 horas.
Tiempo de respuesta	2-4 días
Volante de petición	8,7-14,4
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Si, 8 h
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	No
Otras consideraciones	NO

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Sangre total
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	Después de retracción de coágulo (60min) separar suero limpio
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	%
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-C1 inhibidor
Sinónimos:	C1 inh
Código Unificado Andaluz:	CLC02278
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específica	Lunes a viernes de 8:30 a 14 horas.
Tiempo de respuesta	10 días
Volante de petición	21-38
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI, 8 h
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	No
Otras consideraciones	NO

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Sangre total
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	Las muestras pretratadas pueden conservarse en tubos cerrados hasta 4 horas a 20-25 °C. Debido a los efectos de evaporación, las muestras
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	mg/dL
Factores de conversión	mg/dL
Valores de referencia	El C1inactivador es un principal regulador de la respuesta inflamatoria. La

DEL PARÁMETRO
Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Ciclosporina
Sinónimos:	Ciclosporina
Código Unificado Andaluz:	CLC01166
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 14 horas.
Tiempo de respuesta	2-4 días
Volante de petición	100-400
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	Itraconazol
Otras consideraciones	NO

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Sangre total
Tipo de contenedor	Tubo Edta tapón morado
Volumen mínimo	300 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	Las muestras pretratadas pueden conservarse en tubos cerrados hasta 4 horas a 20?25 °C. Debido a los efectos de evaporación, las muestras
Observaciones a la toma del espécimen	Las muestras pretratadas pueden conservarse en tubos cerrados hasta 4 horas a 20?25 °C. Debido a los efectos de evaporación, las muestras
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/mL
Factores de conversión	ng/mL
Valores de referencia	La ciclosporina ha sido el primer fármaco identificado para inhibir demaner

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Componente M (Crioprecipitado)
Sinónimos:	Componente M (Crioprecipitado)
Código Unificado Andaluz:	IA 20201
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específica	Lunes a viernes de 8:30 a 14 horas.
Tiempo de respuesta	10 días
Volante de petición	Las inmunoglobulinas monoclonales no están presentes
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	No
Otras consideraciones	NO

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Sangre total
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	Después de retracción de coágulo (60min) separar suero limpio y congelar
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	Presencia/Ausencia
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Cortisol
Sinónimos:	Cortisol orina
Código Unificado Andaluz:	CLC12029
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Ninguna

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	50 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	nmol/L
Factores de conversión	µg/dL
Valores de referencia	Función o disfunción de las glándulas suprarrenales, la hipófisis y el hipotálamo

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	"nmol/L x 0,03625 = µg/dL; nmol/L x 0,3625 = µg/L; µg/dL x 27,586 = nmol/L; µg/L x 2,7586 = nmol/L"
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Cortisol (120 min)
Sinónimos:	Cortisol (120min)
Código Unificado Andaluz:	CLC11994
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Ninguna

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	50 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	nmol/L
Factores de conversión	µg/dL
Valores de referencia	Función o disfunción de las glándulas suprarrenales, la hipófisis y el hipotálamo

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	"nmol/L x 0,03625 = µg/dL; nmol/L x 0,3625 = µg/L; µg/dL x 27,586 = nmol/L; µg/L x 2,7586 = nmol/L"
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Cortisol (15 min)
Sinónimos:	Cortisol (15 min)
Código Unificado Andaluz:	CLC11983
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Ninguna

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	50 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	nmol/L
Factores de conversión	µg/dL
Valores de referencia	Función o disfunción de las glándulas suprarrenales, la hipófisis y el hipotálamo

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	"nmol/L x 0,03625 = µg/dL; nmol/L x 0,3625 = µg/L; µg/dL x 27,586 = nmol/L; µg/L x 2,7586 = nmol/L"
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Cortisol (30 min)
Sinónimos:	Cortisol (30min)
Código Unificado Andaluz:	CLC11985
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Ninguna

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	50 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	nmol/L
Factores de conversión	µg/dL
Valores de referencia	Función o disfunción de las glándulas suprarrenales, la hipófisis y el hipotálamo

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	"nmol/L x 0,03625 = µg/dL; nmol/L x 0,3625 = µg/L; µg/dL x 27,586 = nmol/L; µg/L x 2,7586 = nmol/L"
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Cortisol (60min)
Sinónimos:	Cortisol (60min)
Código Unificado Andaluz:	CLC11989
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Ninguna

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	50 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	nmol/L
Factores de conversión	µg/dL
Valores de referencia	Función o disfunción de las glándulas suprarrenales, la hipófisis y el hipotálamo

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	"nmol/L x 0,03625 = µg/dL; nmol/L x 0,3625 = µg/L; µg/dL x 27,586 = nmol/L; µg/L x 2,7586 = nmol/L"
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Cortisol (90min)
Sinónimos:	Cortisol (90min)
Código Unificado Andaluz:	CLC11993
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Ninguna

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	50 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	nmol/L
Factores de conversión	µg/dL
Valores de referencia	Función o disfunción de las glándulas suprarrenales, la hipófisis y el hipotálamo

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	"nmol/L x 0,03625 = µg/dL; nmol/L x 0,3625 = µg/L; µg/dL x 27,586 = nmol/L; µg/L x 2,7586 = nmol/L"
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Crioglobulinas
Sinónimos:	Crioglobulinas
Código Unificado Andaluz:	CLC03303
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 14 horas.
Tiempo de respuesta	7 días
Volante de petición	No presente.
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	No

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Si, 8 h
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	No
Otras consideraciones	Condiciones preanalíticas especiales: la muestra se debe de extraer y transportar a 37°C, no perder la cadena de temperatura en ningún momento.

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Sangre total
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo SIN gel separador tipo orina de 10mL
Volumen mínimo	2 ml
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	Después de retracción de coágulo (60min) a 37°C en estufa, separar suero limpio y mantener 0.5ml a 37°C y otro 0.5 ml de 2-8°C
Observaciones a la toma del espécimen	Material atemperado a 37°C (jeringa y tubos sin separador
Recomendaciones para transporte	Transporte 37°C. Evitar romper la cadena de temperatura 37°C.
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	Presencia/Ausencia
Valores de referencia	La crioglobulinemia es parte de un grupo de enfermedades que causan vas

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Evelolimus calculado
Sinónimos:	Everolimus calculado
Código Unificado Andaluz:	BA900
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 14 horas.
Tiempo de respuesta	7 días
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	No
Otras consideraciones	NO

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Sangre total
Tipo de contenedor	Tubo Edta tapón morado
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	Las muestras pretratadas pueden conservarse en tubos cerrados hasta 4 horas a 20?25 °C. Debido a los efectos de evaporación, las muestras
Observaciones a la toma del espécimen	Las muestras pretratadas pueden conservarse en tubos cerrados hasta 4 horas a 20?25 °C. Debido a los efectos de evaporación, las muestras
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/mL
Factores de conversión	
Valores de referencia	El fármaco tiene numerosas aplicaciones clínicas siendo las más destacadas

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Everolimus
Sinónimos:	Everolimus
Código Unificado Andaluz:	CLC01216
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específica	Lunes a viernes de 8:30 a 14 horas.
Tiempo de respuesta	7 días
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	No
Otras consideraciones	NO

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Sangre total
Tipo de contenedor	Tubo Edta tapón morado
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	Las muestras pretratadas pueden conservarse en tubos cerrados hasta 4 horas a 20?25 °C. Debido a los efectos de evaporación, las muestras
Observaciones a la toma del espécimen	Las muestras pretratadas pueden conservarse en tubos cerrados hasta 4 horas a 20?25 °C. Debido a los efectos de evaporación, las muestras
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/mL
Factores de conversión	
Valores de referencia	El everolimus ejerce sus efectos inmunosupresores y anti-proliferativos por

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Gamma-Globulina (EF)
Sinónimos:	Gamma-Globulina (EF)
Código Unificado Andaluz:	CLC00616
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 14 horas.
Tiempo de respuesta	2-4 días
Volante de petición	0,64-1,2
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Si, 8 h
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	No
Otras consideraciones	NO

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Sangre total
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	Después de retracción de coágulo (60min) separar suero limpio
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	g/dL
Factores de conversión	
Valores de referencia	La gamma globulina es un conjunto de proteínas presentes en la sangre co

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Gamma-Globulina (porcentaje)
Sinónimos:	Gamma-Globulina (porcentaje)
Código Unificado Andaluz:	CLC00625
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 14 horas.
Tiempo de respuesta	2-4 días
Volante de petición	10,6-19,2
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Si, 8 h
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	No
Otras consideraciones	NO

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Sangre total
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	Después de retracción de coágulo (60min) separar suero limpio
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	%
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Gentamicina pico
Sinónimos:	Gentamicina pico
Código Unificado Andaluz:	CLC01191
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 14 horas.
Tiempo de respuesta	2-4 días
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	Netilmicina y Sisomicina
Otras consideraciones	NO

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Sangre total
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	Después de retracción de coágulo (60min) separar suero limpio
Observaciones a la toma del espécimen	Las muestras pretratadas pueden conservarse en tubos cerrados hasta 4 horas a 20-25 °C. Debido a los efectos de evaporación, las muestras
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ug/mL
Factores de conversión	umol/L
Valores de referencia	La supervisión de las concentraciones de gentamicina en suero, junto con

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	2,16
-------------------------	------

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Gentamicina valle
Sinónimos:	Gentamicina valle
Código Unificado Andaluz:	CLC01212
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 14 horas.
Tiempo de respuesta	2-4 días
Volante de petición	Los datos presentados muestran que las concentraciones mínimas de genta
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	Netilmicina y Sisomicina
Otras consideraciones	NO

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Sangre total
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	Después de retracción de coágulo (60min) separar suero limpio
Observaciones a la toma del espécimen	Las muestras pretratadas pueden conservarse en tubos cerrados hasta 4 horas a 20-25 °C. Debido a los efectos de evaporación, las muestras
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ug/mL
Factores de conversión	umol/L
Valores de referencia	La supervisión de las concentraciones de gentamicina en suero, junto con

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	2,16
-------------------------	------

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Gonadotropina coriónica humana
Sinónimos:	Coriogonadotropina total (prenatal)
Código Unificado Andaluz:	CLC11768
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	12-24 horas
Volante de petición	0.100?10000 mUI/mL
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Ninguna

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	10µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mUI/mL
Valores de referencia	Diagnóstico prenatal

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Hormona luteinizante (120 min)
Sinónimos:	Lutropina/LH (120min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11833
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	Sexo, fase del ciclo ovulatorio

¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	SI
Supresión de fármacos anterior a la prueba	
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	mUI/mL
Factores de conversión	mu.int./L
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Infliximad anticuerpo
Sinónimos:	Infliximad anticuerpo
Código Unificado Andaluz:	CLC04376
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 14 horas.
Tiempo de respuesta	10 días
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	No
Otras consideraciones	NO

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Sangre total
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	Después de retracción de coágulo (60min) separar suero limpio y congelar
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	Junto con la medición de las concentraciones farmacológicas de infliximab,

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Infliximad nivel
Sinónimos:	Infliximad nivel
Código Unificado Andaluz:	CLC04375
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 14 horas.
Tiempo de respuesta	10 días
Volante de petición	03-jul
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	No
Otras consideraciones	NO

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Sangre total
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	Después de retracción de coágulo (60min) separar suero limpio y congelar
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ug/mL
Factores de conversión	
Valores de referencia	La identificación de las concentraciones farmacológicas puede ser importan

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Proteína S-100b
Sinónimos:	S-100
Código Unificado Andaluz:	CLC01738
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	12-24 horas
Volante de petición	<0,1 µg/mL
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	SI/NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	20 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	µg/mL
Factores de conversión	µg/mL
Valores de referencia	Evaluación del tratamiento y evolución de pacientes con melanoma.

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Proteinograma
Sinónimos:	Proteinograma
Código Unificado Andaluz:	CLC00608
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas.
Tiempo de respuesta	2-4 días
Volante de petición	Albumina: Alfa1: Alfa2: Beta: Gamma
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Sí

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Si, 8 h
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	No
Otras consideraciones	NO

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Sangre total
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	Después de retracción de coágulo (60min) separar suero limpio
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	Porcentaje /g/L
Valores de referencia	El proteinograma es el método de análisis con mayor sensibilidad clínica pa

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Proteinograma (interpretación)
Sinónimos:	Proteinograma (interpretación)
Código Unificado Andaluz:	CLC01068
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 14 horas.
Tiempo de respuesta	2-4 días
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Si, 8 h
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	No
Otras consideraciones	NO

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Sangre total
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	Después de retracción de coágulo (60min) separar suero limpio
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Renina
Sinónimos:	Renina
Código Unificado Andaluz:	CLC 12167
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	7 días
Volante de petición	2,4-46 pg/mL
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Ninguna

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	PLASMA (EDTA)
Tipo de contenedor	Tubo frío con EDTA, tapón morado
Volumen mínimo	35 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Separe el plasma en una centrifugadora refrigerada. Determine las muestras inmediatamente o congélelas a -20°C.

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	"pg/mL; ng/L"
Factores de conversión	"pg/mL; ng/L"
Valores de referencia	Útil en el diagnóstico y en el tratamiento de varios tipos de hipertensión

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Sirolimus
Sinónimos:	Sirolimus
Código Unificado Andaluz:	CLC01168
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 14 horas.
Tiempo de respuesta	2-4 días
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	No
Otras consideraciones	NO

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Sangre total
Tipo de contenedor	Tubo Edta tapón morado
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	Las muestras pretratadas pueden conservarse en tubos cerrados hasta 4 horas a 20?25 °C. Debido a los efectos de evaporación, las muestras
Observaciones a la toma del espécimen	Las muestras pretratadas pueden conservarse en tubos cerrados hasta 4 horas a 20?25 °C. Debido a los efectos de evaporación, las muestras
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/mL
Factores de conversión	
Valores de referencia	El sirolimus es un inhibidor de las señales de proliferación y bloquea la señal

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Tacrolimus
Sinónimos:	Tacrolimus
Código Unificado Andaluz:	CLC01169
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 14 horas.
Tiempo de respuesta	2-4 días
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	Itraconazol
Otras consideraciones	NO

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Sangre total
Tipo de contenedor	Tubo Edta tapón morado
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	Las muestras pretratadas pueden conservarse en tubos cerrados hasta 4 horas a 20-25 °C. Debido a los efectos de evaporación, las muestras
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/mL
Factores de conversión	
Valores de referencia	El tacrolimus ejerce su principal efecto inmunosupresor inhibiendo la activac

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Tiroglobulina
Sinónimos:	Tiroglobulina
Código Unificado Andaluz:	CLC11011
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específica	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	12-24 horas
Volante de petición	<0,1 ng/ml
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	20 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/ml
Factores de conversión	µg/mL
Valores de referencia	Seguimiento carcimona papilar y folicular de tiroides

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Tiroxina libre (120 min)
Sinónimos:	T4L (120min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11279
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	12-24 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/L
Factores de conversión	pmol/L
Valores de referencia	Diagnóstico diferencial de los estados hipo-, hiper- y eutiroideos.

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	pmol/L x 0,077688 = ng/dL, ng/dL x 12,872 = pmol/L, pmol/L x 0,77688 = ng/L
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Tiroxina libre (20 min)
Sinónimos:	T4L (20min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11057
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	12-24 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/L
Factores de conversión	pmol/L
Valores de referencia	Diagnóstico diferencial de los estados hipo-, hiper- y eutiroideos.

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	pmol/L x 0,077688 = ng/dL, ng/dL x 12,872 = pmol/L, pmol/L x 0,77688 = ng/L
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Tiroxina libre (30 min)
Sinónimos:	T4L (30min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11277
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	12-24 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/L
Factores de conversión	pmol/L
Valores de referencia	Diagnóstico diferencial de los estados hipo-, hiper- y eutiroideos.

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	$\text{pmol/L} \times 0,077688 = \text{ng/dL}$, $\text{ng/dL} \times 12,872 = \text{pmol/L}$, $\text{pmol/L} \times 0,77688 = \text{ng/L}$
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Tiroxina libre (60 min)
Sinónimos:	T4L (60min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11280
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	12-24 horas
Volante de petición	Según edad y sexo
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ng/L
Factores de conversión	pmol/L
Valores de referencia	Diagnóstico diferencial de los estados hipo-, hiper- y eutiroideos.

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	pmol/L x 0,077688 = ng/dL, ng/dL x 12,872 = pmol/L, pmol/L x 0,77688 = ng/L
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Tobramicina pico
Sinónimos:	Tobramicina pico
Código Unificado Andaluz:	CLC02510
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 14 horas.
Tiempo de respuesta	2-4 días
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	Amikamicina y Kanamicina
Otras consideraciones	NO

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Sangre total
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	Después de retracción de coágulo (60min) separar suero limpio
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ug/mL
Factores de conversión	umol/L
Valores de referencia	Las mediciones obtenidas con este dispositivo sirven para diagnosticar y tr

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	2,14
-------------------------	------

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Tobramicina valle
Sinónimos:	Tobramicina valle
Código Unificado Andaluz:	CLC02511
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 14 horas.
Tiempo de respuesta	2-4 días
Volante de petición	las concentraciones mínimas de tobramicina de 1–2 µg/mL (2,1–4,3 µmol/L)
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	Amikamicina y Kanamicina
Otras consideraciones	NO

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Sangre total
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	Después de retracción de coágulo (60min) separar suero limpio
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	µg/mL
Factores de conversión	µmol/L
Valores de referencia	Las mediciones obtenidas con este dispositivo sirven para diagnosticar y tr

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	2,14
-------------------------	------

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Triyodotironina libre
Sinónimos:	T3L
Código Unificado Andaluz:	CLC 11007
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	12-24 horas
Volante de petición	"Adultos: 2,5-3,9 pg/mL; Niños y adolescentes: según edad"
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	SI
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	15 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	17,2
Unidades convencionales	pg/mL
Factores de conversión	pmol/L
Valores de referencia	Diagnóstico diferencial de los estados hipo-, hiper- y eutiroideos.

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	pmol/L x 0,651 = pg/mL, pg/mL x 1,536 = pmol/L, pg/mL x 0,1 = ng/dL
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Triyodotironina libre (120min)
Sinónimos:	T3L (120 min)
Código Unificado Andaluz:	CLC 11658
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	12-24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	NO

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	SUERO
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	40µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	pg/mL
Factores de conversión	pmol/L
Valores de referencia	Diagnóstico diferencial de los estados hipo-, hiper- y eutiroideos.

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Vancomicina pico
Sinónimos:	Vancomicina pico
Código Unificado Andaluz:	CLC01155
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 14 horas.
Tiempo de respuesta	2-4 días
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	No
Otras consideraciones	NO

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Sangre total
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	Después de retracción de coágulo (60min) separar suero limpio
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	ug/mL
Factores de conversión	umol/L
Valores de referencia	Las mediciones obtenidas con este dispositivo sirven para diagnosticar y tr

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	0,67
-------------------------	------

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srm-Vancomicina valle
Sinónimos:	Vancomicina valle
Código Unificado Andaluz:	CLC01156
Disponible para:	Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 14 horas.
Tiempo de respuesta	2-4 días
Volante de petición	Las concentraciones mínimas de vancomicina en suero de 5,0–10 µg/mL (3
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	No
Otras consideraciones	NO

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Sangre total
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	200 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	Después de retracción de coágulo (60min) separar suero limpio
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	µg/mL
Factores de conversión	µmol/L
Valores de referencia	Las mediciones obtenidas con este dispositivo sirven para diagnosticar y tr

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	0,67
-------------------------	------

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Srn-Componente M (identificación)
Sinónimos:	Componente M (identificación)
Código Unificado Andaluz:	CLC01143
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 14 horas.
Tiempo de respuesta	10 días
Volante de petición	Las inmunoglobulinas monoclonales no están presentes
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	No
Otras consideraciones	NO

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Sangre total
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador
Volumen mínimo	500 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	Después de retracción de coágulo (60min) separar suero limpio y congelar
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Transporte refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	Presencia/ Ausencia
Valores de referencia	Trastornos en el sistema inmunitario tales como mieloma múltiple o macro

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	T
Sinónimos:	TRIGLICERIDOS
Código Unificado Andaluz:	CLC00653
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	<150 mg/dl
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas.
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	El ácido ascórbico y el dobesilato de calcio causan valores de triglicéridos falsamente elevados.
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero. Plasma: tratado con heparina de litio, EDTA bipotásico,
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de litio
Volumen mínimo	2 µl
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	37,2
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	Las cuantificaciones de triglicéridos se utilizan en el diagnóstico y tratamiento de la dislipidemia.

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	mmol/L x 88,5 = mg/dL mg/dL x 0,0113 = mmol/L
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	TESTGES
Sinónimos:	Prueba de Embarazo
Código Unificado Andaluz:	CLC00108
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	Inferior a 24 horas
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	Positivo/Negativo
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Transferencia embrionaria (embriones en fresco)
Sinónimos:	Transferencia de embriones en fresco
Código Unificado Andaluz:	RHA80
Disponible para:	Atención especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes a las 12 horas.
Tiempo de respuesta	24 horas-2 semanas.
Volante de petición	
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	No

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	No
Dieta previa a la prueba	No
Supresión de fármacos anterior a la prueba	Sí (progesterona)
Otras consideraciones	Higiene genital

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Embriones en fresco
Tipo de contenedor	Placas de transferencia
Volumen mínimo	No procede
Conservante	Medios de cultivo específicos
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	No Procede
Observaciones a la toma del espécimen	No Procede
Recomendaciones para transporte	Manipular el embrión en condiciones estériles
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	U
Sinónimos:	UREA
Código Unificado Andaluz:	CLC00503
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específica	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	Adulto 17 – 43 mg/dL Neonatos 8,4 – 25,8 mg/dL Bebés/Niños 10,8 – 38,4
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	Ayuno 9 horas./NO en petición urgente
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Suero.Plasma: tratado con heparina de litio, EDTA bipotásico,
Tipo de contenedor	Tubo bioquímica tapón amarillo con gel separador o tubo con heparina de l
Volumen mínimo	2 µl
Conservante	
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	18,3
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	La determinación de urea en sangre es la prueba más utilizada para el criba

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	mmol/L de urea x 6,006 = mg/dL de urea mmol/L de urea x 0,06006 = g/L de urea mmol/L de nitrógeno ureico x 2,801 = mg/dL de nitrógeno ureico mmol/L de nitrógeno ureico x 0,02801 = g/L de nitrógeno ureico mg/dL de urea x 0,467 = mg/dL de nitrógeno ureico
-------------------------	---

"Urobilinógeno (orina; tira color)"

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	UMA 714
Sinónimos:	"Urobilinógeno (orina; tira color)"
Código Unificado Andaluz:	CLC00122
Disponible para:	Urgencias y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicas	Disponible 24 horas de lunes a domingo
Tiempo de respuesta	Disponible 24 horas de lunes a domingo
Volante de petición	<1,5
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	NINGUNA

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	orina
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo,
Volumen mínimo	2 ml
Conservante	NO
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerado
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dL
Valores de referencia	

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	UMA 714
Sinónimos:	urobilinogeno en orina
Código Unificado Andaluz:	CLC00122
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específicos	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	Positivo >2,0 mg/dl
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	EL CARBAPENEM PUEDE PROVOCAR FALSOS POSITIVOS
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 CC
Conservante	2 CC
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	
Unidades convencionales	
Factores de conversión	
Valores de referencia	enfermedades hepáticas, anemias hemolíticas.

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	UO
Sinónimos:	UREA EN ORINA
Código Unificado Andaluz:	CLC00974
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específica	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	Primera orina de la mañana 900-3000 mg/dL
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 µl
Conservante	REFRIGERAR
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	La proliferación bacteriana en la muestra y la alta concentración atmosférica del amoníaco, así como la contaminación por iones de

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	25,9
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	La excreción urinaria de urea oscila entre límites muy amplios: 6-20 g/díae

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	$\text{mmol/L de urea} \times 6,006 = \text{mg/dL de urea}$ $\text{mmol/L de urea} \times 0,06006 = \text{g/L de urea}$ $\text{mmol/L de nitrógeno ureico} \times 2,801 = \text{mg/dL de nitrógeno ureico}$ $\text{mmol/L de nitrógeno ureico} \times 0,02801 = \text{g/L de nitrógeno ureico}$ $\text{mg/dL de urea} \times 0,467 = \text{mg/dL de nitrógeno ureico}$
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	UO24
Sinónimos:	UREA ORINA 24 HORAS
Código Unificado Andaluz:	CLC01222
Disponible para:	Urgencias, Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	10000-350000 mg/24h
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA 24 H
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 µl
Conservante	REFRIGERAR
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	La proliferación bacteriana en la muestra y la alta concentración atmosférica del amoníaco, así como la contaminación por iones de

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	25,9
Unidades convencionales	
Factores de conversión	mg/dl
Valores de referencia	Funcion renal, Aumenta en estados de hipercatabolismo proteico y en dieta

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	mmol/L de urea x 6,006 = mg/dL de urea mmol/L de urea x 0,06006 = g/L de urea mmol/L de nitrógeno ureico x 2,801 = mg/dL de nitrógeno ureico mmol/L de nitrógeno ureico x 0,02801 = g/L de nitrógeno ureico mg/dL de urea x 0,467 = mg/dL de nitrógeno ureico. Al emplear orina de 24 horas como muestra.
-------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	UOR
Sinónimos:	UREA ELIMINADA
Código Unificado Andaluz:	CLC00977
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12 horas.
Tiempo de respuesta	1-24 horas
Volante de petición	15.000 – 34.200 mg/24h
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	Si

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	ORINA 24 H
Tipo de contenedor	Tubo de tapón amarillo
Volumen mínimo	2 µl
Conservante	REFRIGERAR
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	Refrigerada
Otras consideraciones	La proliferación bacteriana en la muestra y la alta concentración atmosférica del amoníaco, así como la contaminación por iones de

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	25,5
Unidades convencionales	
Factores de conversión	24H
Valores de referencia	Funcion renal, Aumenta en estados de hipercatabolismo proteico y en dieta

DEL PARÁMETRO

Utilidad Clínica	mmol/L de urea x 6,006 = mg/dL de urea mmol/L de urea x 0,06006 = g/L de urea mmol/L de nitrógeno ureico x 2,801 = mg/dL de nitrógeno ureico mmol/L de nitrógeno ureico x 0,02801 = g/L de nitrógeno ureico mg/dL de urea x 0,467 = mg/dL de nitrógeno ureico. Al emplear orina de 24 horas como muestra.
-------------------------	--

ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA

Nombre SI:	Uri- Cortisol Orina excrección 24h
Sinónimos:	CORT ORI Excr (24h)
Código Unificado Andaluz:	CLC12027
Disponible para:	Atención Primaria y Atención Especializada
Días/horas de recepción específico	Lunes a viernes de 8:30 a 12horas.
Tiempo de respuesta	24-48 horas
Volante de petición	58-403 µg/24h
¿Se puede obtener en centros de extracción periféricos?	SI

DEL PACIENTE

Periodo de ayuno anterior a prueba	NO
Dieta previa a la prueba	NO
Supresión de fármacos anterior a la prueba	NO
Otras consideraciones	Ninguna

DEL ESPÉCIMEN

Tipo de espécimen	Orina 24 h
Tipo de contenedor	Tubo vacío tapón beige (O24h)
Volumen mínimo	20 µl
Conservante	No
Demora máxima pre-tratamiento para la obtención de la muestra	
Observaciones a la toma del espécimen	
Recomendaciones para transporte	
Otras consideraciones	Centrifugar en 1 hora tras la recogida de muestra

DEL RESULTADO

Unidades internacionales	4,2
Unidades convencionales	µg/24h
Factores de conversión	µg/24h
Valores de referencia	Función o disfunción de las glándulas suprarrenales, la hipófisis y el hipotál

DEL PARÁMETRO**Utilidad Clínica**

